

Variationsstatistische Untersuchungen an Wintergerstensorten.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

einer

Hohen Naturwissenschaftlichen Fakultät

der

Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

vorgelegt von

Friedrich Karl Büchner

Diplomlandwirt

aus Posen.

Halle-Saale

Ostdeutsche Druckerei und Verlagsanstalt, Inhaber Otto Jung.

1927.

Referent:

Professor Dr. Th. Roemer-Halle.

Korreferent:

Professor Dr. P. Holdefleiß-Halle.



Meinen lieben Eltern!

Inhaltsangabe.

Einleitung	7
Das Versuchsmaterial	9
Die Versuchsanstellung	13
Der Verlauf der Untersuchungen	17
Die Auswertung der Ergebnisse	29
Die durchschnittlichen Variationskoeffizienten der Einzel- sorten	79
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse	82
Anhang I: Vergleich der Variabilitätsintensität von 12 Eigen- schaften bei Sorten von 5 Getreidearten (mit Über- sichtstabelle)	88
Literaturangaben	91



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Einleitung.

Mit der gleichzeitigen Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln durch drei Forscher um die letzte Jahrhundertwende machte sich in der Vererbungswissenschaft ganz allgemein das Bestreben geltend, sich von den bisherigen, rein empirischen Erfahrungen und Betrachtungen loszulösen und sie zu festen Gesetzmäßigkeiten zu verdichten. Wenn man jetzt in der Lage war, durch exakte experimentelle Forschung die Erblichkeit der Merkmale einer Art sicher festzulegen, so ließ es sich nicht umgehen, auch die Variabilität des Versuchsmaterials klarer zu erfassen. Bisher hatte man sich mit Messungen an ihm begnügt, ohne jedoch die Zufälligkeiten zu beachten, die jedes Messungsergebnis mit einem gewissen Fehler behaften. Diese Praktik wurde hauptsächlich von den Anthropologen und Zoologen geübt, von denen besonders Quetelet und Davenport genannt seien. Man kam schließlich zu der Überzeugung, daß Gesetzmäßigkeiten nur auf einer Basis aufgebaut werden konnten, die selbst auch mathematischer Kritik standhielt. Es entstand nun eine Forschungsrichtung, wir nennen sie die Biometrische Schule, die die Variationserscheinungen statistisch zu erfassen und die Ergebnisse in feste Formeln zu drängen suchte. Das Zentrum dieser Bestrebungen lag in England, Namen wie Pearson (13) und Spearman geben die Hauptvertreter wieder, auch Deutsche, so u. a. der Zoologe Duncker und besonders der Mathematiker Fechner (13) sind hier zu nennen. Anwendung fand die Variationsstatistik in Johannsens „Elementen der exakten Erblichkeitslehre“ (9). Man schuf eine gewisse Einheitlichkeit in dem Gemisch von Variationsmaßen und Bezeichnungen, und Johannsens klares Herausschälen der

wahren, erblichen Variation aus dem Deckmantel der nicht-erblichen Modifikabilität, das er durch die Isolation reiner Linien aus Liniengemischen auf Grund seiner botanischen Experimente vermochte, bildet das Fundament der modernen Erblchkeitsforschung; auf ihm baut auch die heutige Pflanzenzüchtung auf. Neben der rein theoretischen Variabilitäts-umgrenzung ist Johannsens Hauptverdienst, daß seine Methode es gestattet, alle auftretenden Variationserscheinungen unter Berücksichtigung ihrer Fehlermöglichkeiten in dem unstrittig vergleichbaren Maßstabe wiederzugeben, wie ihn der Variationskoeffizient darstellt. Sie hat ferner den Vorteil, daß sie es erlaubt, die Mittelwerte vieler gleichartiger Variationsreihen miteinander zu vergleichen unter der Voraussetzung, daß die Grundlagen der Vergleichsobjekte dieselben sind. Wir haben also die Möglichkeit bekommen, Linien- und Sortenmittel in unanstoßiger Rangordnung systematisch zu ordnen.

Mit Johannsens Arbeiten begann eine Vertiefung der Variabilitätsforschung in unserer Pflanzenzüchtung; man begann die Erblchkeitsverhältnisse unserer Kulturpflanzen in festen Umrissen zu skizzieren, ich nenne nur die Namen Roemer (15), Oetken (6), Hillmann, Tornau u. a.

Die vorliegende Arbeit soll das vierte Glied einer Reihe von Arbeiten bilden, die am Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung in Halle durchgeführt werden, um unter gleichen Bedingungen und in gleicher Fragestellung die Variabilitätsverhältnisse unserer Getreidearten klarzustellen, und die für Sommerweizen und Winterweizen, Sommergerste und Hafer bereits der Allgemeinheit der Züchtung zugänglich gemacht sind. Ihre Aufgabe erstreckt sich insbesondere auf die Erfassung der Variabilitätsgrenzen an einer Auswahl von Sorten und Stämmen, um abschließend diese Ergebnisse denen aus der statistischen Untersuchung anderer Getreidearten gegenüberzustellen.

Das Versuchsmaterial.

Das Saatgut für die Untersuchungsstämme hatte die Pflanzenzuchtstation der Landwirtschaftlichen Institute Halle zur Verfügung gestellt. Es war durchweg Originalsaatgut, wie es zur Durchführung der Sortenversuche von den Züchtern angeliefert war. Als Prüfungsobjekte wurden die 11 wichtigsten Sorten der Herbstanbauprüfung für Wintergerste 1924 gewählt, von denen eine, Stotz' Salemer, wegen Schmachtkornbildung infolge zu starken Lagers und, weil sie in der Vegetation wesentlich weit zurück war, nicht mitgeerntet wurde. Hinzugenommen wurden noch 9 Zuchtstämme der Pflanzenzuchtstation, teils weil sie sich bereits in der Sortenprüfung bewährt oder sonst besonders konstant erwiesen hatten, dann aber auch, um an ihnen ihre Übereinstimmungen und Abweichungen bei gleicher Abstammung untersuchen zu können.

Es folgt eine kurze Charakteristik der untersuchten Sorten und Stämme unter Benutzung der Sortenbeschreibung von Baumann (1), der „Deutschen Hochzuchten“, Bd. 5 (3), von Rümker (18) und Schindler (20), sowie eigener Angaben der Züchter selbst.

Sämtliche Sorten und Stämme gehören dem Inaequale-Typ an, sind also vierzeilig.

Ackermanns Viktoria entstammt einer Aufspaltung aus Kirsches zweizeiliger W.G., die bis 1917 in Weihestephan züchterisch bearbeitet wurde. Die vierzeiligen Stämme werden in fortgesetzter Individualauslese weitergezüchtet. Die Sorte zeigt gute Winter- und Lagerfestigkeit, mittelfrühe Reife, langes, aber starkes Stroh und mittellange Ähren mit mittelgroßem Korn.

Eglfinger ist im Jahre 1914 hervorgegangen aus einer spontanen Kreuzung von Kirsches 4-zeiliger mit einer 2-zeiligen Sorte. Sie ist gut lager- und winterfest, aber ziemlich spätreif. Das Stroh ist kurz und straff, die Ähre kurz und gut bekörnt. Das Korn ist mittelgroß mit deutlich gekräuselter Spelze. Die Sorte ist geeignet für gute und mittelmilde Böden und zeichnet sich durch höhere Trockenheitsresistenz aus.

Strengs W.G. hat ihren Ursprung in einer Landsorte aus der Wetterau. 1910 durch Formentrennung gewonnen, wird sie seitdem in fortgesetzter Pflanzenauslese weiterveredelt. Sie besitzt langes, sehr lagerfestes Stroh, lange Ähren mit gutem Besatz und mittelgroßes Korn. Die Reife ist spät. Durch hohe Winterfestigkeit und Anspruchslosigkeit an die Bodenverhältnisse eignet sie sich besonders für rauhe Gegenden.

Friedrichswerther Berg wurde durch Ährenauslese aus einer dortigen Landsorte gewonnen, die nach Schindler (20) Mamuth-Typ hat. v. Rümker (18) spricht von einer Einkreuzung mit Groninger im Jahre 1903, die wohl die nur mäßige Lagerfestigkeit verschuldet. Die Sorte hat mittellanges Stroh, lange Ähre mit gutem Besatz, späte Reife, aber guten Ertrag. Hohe Winterfestigkeit und ihr Ursprung aus rauher Gegend macht sie gleichfalls für rauhe Klimate geeignet.

Dr. Grundmanns Wotan, aus einer Kreuzung von Eckendorfer und Wustermarscher stammend, wird seit 1916 in fortgesetzter Individualauslese weitergezüchtet. Zuchtziel: früher als Friedrichswerther, im Ertrage ihr gleich. Die Sorte hat lange Ähren mit vollem Korn, das sich besonders durch Dünnschaligkeit auszeichnet.

Janetzki's späte W.G. entstammt einer Pflanze, die aus einer Landsorte der Theißebeene entnommen war. In Zuchtbearbeitung ist sie seit 1912 mit dem Zuchtziel einer lagerfesten W.G. für gute Böden und intensive Betriebe. Sie ist sehr spät in der Jugendentwicklung, zeigt zunächst auffällig liegenden Wuchstyp. In nachholendem Wachstum zeigt sie dann straff aufrechten Wuchs. Die Reife ist spät.

Eckendorfer Mammuth wurde im Jahre 1888 aus einer dort angebauten Landgerste vom Mammuth-Typ zunächst durch Massenauslese, seit 1903 durch Individualauslese gezüchtet. Die Gerste zeichnet sich durch eine hohe Bestockungsfähigkeit aus, hat aber dabei nur verhältnismäßig schwaches Stroh. Die Ähre ist mittellang, aber gut besetzt, ihre Ertragsfähigkeit ist besonders hoch. In der Frühreife steht Eckendorfer unter den Sorten des Handels fast stets an erster Stelle. In Gegenden, die nicht besonders auf Winterfestigkeit zu achten brauchen, ist sie stark verbreitet.

Es folgen drei Sorten, die Abkömmlinge der Eckendorfer Mammuth W. G. sind:

Weihenstephaner Egild: ihre Züchtung wurde 1914 durch Feldauslese von Einzelpflanzen begonnen und unter Formentrennung und Veredlungsauslese fortgesetzt. Im Typ ähnelt sie stark der Eckendorfer, ist aber etwas kürzer im Stroh. Sie zeichnet sich durch frühe Jugendentwicklung und Frühreife aus. Ihr Anbau empfiehlt sich für mittlere bis gute Böden, auch in trockener Lage.

Hanses Hübitzer: sie wurde 1918 durch Individualauslese aus einer in der Grafschaft Mansfeld gebauten Landsorte vom Eckendorfer Typ in Zuchtbearbeitung genommen. Sie ist als Gerste für besonders trockene Gebiete, wie es ja auch das Zuchtgebiet im Regenschatten des Harzes ist, gedacht. Sie zeichnet sich außerdem durch besondere Frühreife aus.

Janetzki's frühe W. G. entstammt ebenfalls einer Gerste vom Eckendorfer Typ, die nach Schlesien vor 1908 als Handelssaatgut gekommen war. Das Zuchtziel ist das der Eckendorfer, jedoch außerdem Steigerung der Frühreife.

Die folgenden 10 Stämme sind Züchtungen der Pflanzenzuchtstation des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Halle.

Zunächst gehören zusammen 8 Zuchtstämme aus einer Kreuzung (Eckendorfer₁₇₅₅ × Schwarze₁₂₀) aus dem Jahre 1912. Aus der F₄-Generation im Jahre 1916 wurden u. a. die Pflanzen 68₁₆ und 147₁₆ ausgelesen und in fortwährendem Anbau bis zu F₉ bzw. F₁₀ ohne Auslese weitergeführt.

Die im Jahre 1921 aufgenommene Individualauslese lieferte aus der Nachkommenschaft von 68₁₆ den Ursprung des Stammes 27₂₁ und im Jahre 1922 den von 181₂₂ und 184₂₂, während in demselben Jahre aus der Nachkommenschaft von 147₁₆ die Ausgangspflanzen der Stämme 194₂₂, 197₂₂, 199₂₂ und 201₂₂ ausgelesen wurden.

Die Kreuzung bezweckte neben dem Hauptzuchtziel des hohen Kornertrags, die Krankheitsresistenz der Schwarzen W. Gersten auf die Eckendorfer zu übertragen, deren Frühreife zu steigern und die Lagerfestigkeit zu verbessern.

Stamm 27₂₁, jetzt als „Kalkreuther Universal“ im Handel, weist vor seinen Abstammungsgeschwistern die Besonderheit auf, daß er als Wechselgerste mit gleichem Erfolge den Anbau im Sommer wie im Winter lohnt. Er besitzt dabei eine gute Winterfestigkeit, was bei einer Wechselgerste ausdrücklich zu bemerken ist. Frohwüchsige Jugendentwicklung und frühe Reife (2 Tage vor Mammuth), zeichnen den Stamm besonders aus, dabei ist er sehr kurz im Stroh und sehr lagerfest. Die Ähre ist mittellang und zeigt einen guten Kornansatz. Der Taubheitsprozentsatz liegt etwa 30—40% unter dem Mittel der Sorten.

Stamm 181₂₂ weist im Wuchs und Ertrag im allgemeinen die gleichen Eigenschaften auf wie Stamm 27₂₁.

Stamm 184₂₂ weicht von den vorhergehenden ab. Er ist etwas später in der Reife als diese trotz früher Jugendentwicklung. Der Wuchstyp in der Jugend ist halbaufrecht, während er bei 27₂₁ und 181₂₂ mehr liegend ist. Das Stroh ist länger und noch stärker. Die Ähre ist kurz und hat großes, volles Korn.

Die Stämme von der Abstammung 147₁₆ zeigen im Entwicklungsrhythmus größte Verschiedenheit. Während 197₂₂ sehr früh in Jugendentwicklung und Reife ist, zeigt 201₂₂ sich spät in beiden Stadien. 194₂₂ und 199₂₂ liegen zwischen beiden.

Der Wuchstyp in der Jugend zeigt bei den vier Stämmen den Übergang von „liegend“ (bei 201₂₂) bis zu „aufrecht“ (bei 197₂₂). Mit dem weiteren Entwicklungsverlauf hat aber scheinbar der Wuchstyp in der Jugend im allgemeinen nichts

zu tun, wie die Beobachtungen ergaben, aber dagegen mit der Modifizierung der Bestockung, wie später zu zeigen sein wird.

Im Stroh sind drei der Stämme mittellang, während einer, 197₂₂, kurz ist. Die Ährenbildung ist bei allen ungefähr die gleiche. Auch in Lagerfestigkeit und Winterfestigkeit sind sie gleich gut.

Stamm 41₂₂ entstammt einer Auslese aus Hohenheimer früher Goldthorpe. Diese, eine Kreuzung von Fruwirths früher Goldthorpe $\times$ einer vierzeiligen W. Gerste, spaltete in Halle stark in zwei- und vierzeilige Pflanzen auf, von denen die zweizeiligen Formen wenig winterfest waren, während die vierzeiligen diese Eigenschaft gut vererben. Stamm 41₂₂ ist spät in Jugendentwicklung und Reife, zeichnet sich aber neben seiner guten Winterfestigkeit durch hohe Lagerfestigkeit aus. Die Ähre ist lang und zeigt ein großes, volles Korn mit sehr feiner Spelze.

Bei Stamm 48₂₂ (vierzeilige aus Schliephackes zweizeiliger) spielt ebenfalls die Züchtung auf Kornqualität eine Rolle: Schliephackes zweizeilige W. G. stammt aus einer Kreuzung von vierzeiliger Mammuth $\times$ zweizeiliger Hannah S. Gerste. Die vierzeiligen Aufspaltungsformen zeigen die Feinspelzigkeit des Sommergersten-Elters. Im übrigen ist der Stamm mittelspät in Jugendentwicklung und Reife, erweist sich aber als sehr winterfest.

Die Versuchsanstellung.

Die Versuchsanstellung erstreckte sich auf die einjährige Vegetationsperiode 1924/25. Die Anlegung der Versuchsbeete geschah im Bereich der Pflanzenzuchtstation Halle, die mir Land und geschulte Arbeitskräfte zur Auslegung des Saatguts zur Verfügung stellte¹⁾.

¹⁾ Hierfür möchte ich auch an dieser Stelle noch besonders danken

Als Vorfrucht diente Lein, der nach gutem Stande das Land in schöner Gare zurückließ. Zur Bearbeitung des Ackers wurde erstmalig die Bodenfräse herangezogen, die den Boden nach vorhergehender Schälffurche in ideale Krümelstruktur brachte. Bodenverschiedenheiten bestanden auf dem Versuchsareal nicht, auch Verschiedenheit im Düngungszustand lag nicht vor, sodaß die Grundbedingungen für sämtliche Versuchsparzellen die gleichen waren, mithin also auch durch die Bodenverhältnisse Modifikation des Pflanzenmaterials nicht eintreten konnte.

Um aber auch die letzte Möglichkeit peinlicher Vermeidung systematischer Fehler auszunutzen, wurde für die Versuchsanstellung eine sechsfache Wiederholung der Versuchsparzellen gewählt. Die Teilstücke wurden nach einer besonderen Übersetzformel schachbrettartig über 6 nebeneinander liegende Beete von 2,50 m Breite und 30 m Länge verteilt. Die Auslegung geschah zuchtgartenmäßig mit der Hand. Die Einzelparzellen umfaßten 6 Reihen mit einem Abstand von 20 cm und 5 cm Kornabstand in der Reihe.

Das Saatgut war zur Vermeidung verschiedener Beizwirkung ungebeizt. Eine Düngergabe erfolgte vor der Saat nicht, jedoch wurden im Frühjahr 12½ kg Natronsalpeter je ¼ ha gegeben.

Die Aussaat erfolgte am 17. September 1924, der Aufgang erfolgte sehr bald, da die Saat noch am gleichen Tage Regen erhielt und dann einige warme Tage folgten. Nach acht Tagen waren ohne bedeutende Unterschiedlichkeit alle Sorten aufgelaufen und zeigten einen durchweg guten Stand. Die nächsten drei Wochen brachten eine regenlose Kälteperiode, die die jungen Pflänzchen in ihrem Wuchs stark aufhielt. Jetzt machten sich in zwei Beeten Fraßstellen des Tausendfüßlers bemerkbar, die mich zwangen, mehrere Wiederholungen ganz auszuschalten, während noch eine von Janetzki später W.G. durch eine Bodensenkung aus der Gleichheit der übrigen herausfiel, so daß auch sie später nicht mitgeerntet wurde. Die Vegetation vollzog sich ohne weitere Hemmungen des Wachstums, der verhältnismäßig milde Winter führte keine bedeutenderen Auswinterungs-

Uebersicht über den Vegetationsverlauf.

Lfd. Nr.	Sortenbezeichnung	Züchter	Aus- saat	Auf- gang	Schos- sen	Stand nach dem Schossen	Gelb- reife	Zahl der verar- beiteten Pflanzen
1	Ackermanns Viktoria	Ackermann-Irlbach	17.9.24	26.9.	22.5.	gut	25.6.	230
2	Eckendorfer Mammuth	v. Borries-Eckendorf	17.9.24	26.9.	20.5.	genügend	23.6.	240
3	Egld	J. Dettweiler-Kreuth Schw.	17.9.24	25.9.	20.5.	sehr gut	23.6.	218
4	Eglinger	Kreisgut Egling Oberbay.	17.9.24	27.9.	23.5.	gut	25.6.	202
5	Friedrichswerther Berg	Meyer-Friedrichswerth	17.9.24	26.9.	24.5.	gut	25.6.	209
6	Hanses Hübitzer	Rittgt. Hübitz bei Eisleben	17.9.24	25.9.	20.5.	gut	23.6.	200
7	Janetzki frühe W. G.	Janetzki-Waltdorf b. Neiße	17.9.24	26.9.	19.5.	gut	23.6.	203
8	Janetzki späte W. G.	"	17.9.24	27.9.	25.5.	gen., teils besser	26.6.	177
9	Strengs	Saatzucht Aspachshof Mfr.	17.9.24	26.9.	24.5.	gut	25.5.	240
10	Dr. Grundmanns Wotan	" Mutzschlena b. Lpz.	17.9.24	26.9.	24.5.	gut	25.5.	240
11	27 ₂₁ ¹⁾ (Eckendorfer × Schwarze W. G.)	Landwirtsch. Institute Halle	17.9.24	26.9.	20.5.	gut	23.5.	280
12	181 ₂₂	"	17.9.24	26.9.	20.5.	gut	23.5.	210
13	184 ₂₂	"	17.9.24	26.9.	21.5.	sehr gut	24.5.	217
14	194 ₂₂	"	17.9.24	26.9.	22.5.	gut	25.5.	224
15	197 ₂₂	"	17.9.24	25.9.	19.5.	sehr gut	22.5.	246
16	199 ₂₂	"	17.9.24	27.9.	20.5.	gut	23.5.	208
17	201 ₂₂	"	17.9.24	26.9.	24.5.	genügend	26.5.	220
18	41 ₂₂ (aus Hohenheimer früher Goldthorpe)	"	17.9.24	26.9.	25.5.	gut	26.5.	212
19	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliep- hackes 2 zl.)	"	17.9.24	26.9.	25.5.	gut	26.5.	233
Summe:								4209 Pflanzen

¹⁾ jetzt als Kalkreuther „Universal“ im Besitz des Ritterguts Kalkreuth Krs. Hoyerswerda.

schäden herbei. Kurz vor der Gelbreife, am 14. und 16. Juni trat bei allen Sorten durch starken Regenfall Lager auf, ohne daß sich hier außer Stotz' Salemer infolge ihrer späten Entwicklung eine Sorte besonders hervorheben ließ. Die Bonitierung war fast durchweg gleich schlecht.

Als tierischer Schädling trat bei allen Sorten gleichmäßig der Getreideblasenfuß (Thrips) auf, der alle Gipfelährchen zerstörte. *Helminthosporium gramineum* wurde nur vereinzelt festgestellt, auch zeigte sich keine Sorteneigentümlichkeit in der Anfälligkeit für *Ustilago hordei nuda*. Im übrigen war die späte Bonitierung durch das Lager auch erschwert.

Das Schossen erfolgte in der Zeit vom 19.—25. Mai; hier zeigten sich deutliche Sortenunterschiede in der Frühe des Schossens wie im allgemeinen Stand, wie sich aus der beigefügten Vegetationstabelle ersehen läßt.

Die Gelbreife trat in den Tagen vom 22.—26. Juni ein und verhielt sich, wie die Tabelle ausweist, im allgemeinen bei den Sorten proportional dem Eintritt des Schossens. Die Ernte wurde in zwei Absätzen vorgenommen, die der frühen Sorten am 24. Juni, die der späteren am 27. Juni. Beide Tage waren durch trockene Witterung begünstigt.

Bei der Aberntung der Teilstücke mußte mit größter Sorgfalt zu Werke gegangen werden, um alle inzwischen eingetretenen, sichtbaren Modifikationen sicher zu erfassen. Zu diesem Zwecke wurden zunächst an beiden Seiten der Beete auf 25 cm Breite alle Pflanzen aufgezo-gen und beseitigt, um die Randbeeinflussung auszuschalten. Ferner wurden jedesmal die beiden äußeren Randreihen jeder Parzelle nicht mitgeerntet und so die Nachbarwirkung von Sorte zu Sorte verhindert; das Hauptaugenmerk aber mußte auf die Beseitigung der Lückennachbarpflanzen gerichtet werden, die bei einfachen Lücken die Reihennachbarn, bei Doppellücken auch die Nachbarn in den nächsten Reihen umfaßte. Die Ausschaltung erfolgte unter ständigem Vergleich mit den Nachwinterbonitierungen der Parzellen und unter der Gegenkontrolle eines freundlichen Helfers.

Die geernteten Normalpflanzen wurden parzellenweise gebündelt und zur Verarbeitung in einem gesicherten, luftigen Raume des Landwirtschaftlichen Instituts untergebracht, wo sie mehrere Monate nachtrocknen konnten.

Der Verlauf der Untersuchungen.

Die variationsstatistische Ausbeutung des geernteten Untersuchungsmaterials umfaßte zwei Perioden:

1. Die Messung des geernteten Pflanzenmaterials und teilweise Verrechnung der Ergebnisse zur Gewinnung der Urzahlen und
2. die Aufstellung der Variationskurven und deren Festlegung in Vergleichswerten.

Die Verarbeitung der Pflanzenbestände mußte unter dem Bestreben nach höchster Genauigkeit erfolgen. Sie geschah unter zeitweiliger gütiger Mithilfe eines Kollegen, und, soweit es die Zeitumstände erlaubten, auch einer geübten Hilfskraft, die mir die Pflanzenzuchtstation zur Verfügung stellte. Das Arbeitsverfahren wurde möglichst zielbewußt gestaltet, dabei aber so einfach wie möglich und unter dem Leitgedanken, durch gegenseitige Kontrolle alle Fehlermöglichkeiten auszuschalten. Die zu den Wägungen benutzten Wagen schlugen auf 0,1 g noch sicher aus. Der Arbeitsgang war folgender:

1. wurde an der Selektionstafel die Länge des längsten Halmes gemessen und zwar vom Bestockungsknoten bis zum untersten Ansatz der Ährenspindel;
2. wurde die Anzahl der Halme festgestellt;
3. wurde das Gesamtpflanzengewicht festgestellt, nachdem vorher die mit Erde versetzte Wurzel am Bestockungsknoten abgeschnitten war. (Dieser eigentliche Versuchsfehler war also bei allen verarbeiteten Pflanzen der gleiche.)
4. wurde an einer Millimeterskala die Länge der Ährenspindel des Haupthalmes abgelesen und zwar von dem Ansatz des untersten Ährchens bis zur Basis des Gipfelährchens;

5. wurde die Ährchenzahl an dieser Spindel gezählt, wobei die tauben Ährchen zunächst mitgezählt, dann besonders notiert wurden.

Nach erfolgter Ausreibung der Körner und Befreiung von den ihnen anhaftenden Bestandteilen geschah

6. und 7. die Zählung und Wägung der Körner des längsten Halmes und

8. und 9. die Feststellung der Gesamtkornzahl und des Gesamtkorngewichts.

Auf rechnerischem Wege erfolgte:

10. die Ermittlung des Tausendkorngewichts aus Kornzahl und Korngewicht nach der Formel

$$\frac{\text{Gesamtkorngewicht} \cdot 1000}{\text{Gesamtkornzahl}} = x.$$

11. die Errechnung des Kornprozents, des prozentischen Anteils des Kornes am Gesamtpflanzengewicht, nach der Formel

$$\frac{\text{Gesamtkorngewicht} \cdot 100}{\text{Pflanzengewicht}} = x \text{ und}$$

12. die Feststellung der Ährendichte D. (nach Neegard), Neegard legt seiner Methode die Anordnung der Ährchen auf einer Normalspindel von 100 mm Länge zu Grunde. Die Berechnung erfolgte nach der Formel

$$\frac{\text{Ährchenzahl} \cdot 100}{\text{Spindellänge}} = \text{Ährendichte D.}$$

Holdefleiß (7) und andere Forscher messen die Abstände der Spindelglieder. Die Neegardsche Methode (6) wählte ich der Einheitlichkeit mit den schon vorliegenden Arbeiten wegen.

Es verblieb noch die rechnerische Erfassung des Prozentanteils der tauben Ährchen an der Gesamtährchenzahl, die ich ebenso wie die Bestimmung der Ährendichte D., weil viele Werte sich stark wiederholten, nach eigenst dafür errechneten Tabellen vornahm, um für jede Sorte dann das arithmetische Sortenmittel des Taubheitsprozentsatzes festzustellen.

Sämtliche bisherigen Rechnungsarbeiten wurden mit dem Loga-Kalkulator ausgeführt.

Die bisher gewonnenen absoluten Werte mußten nun in Vergleichswerte umgerechnet werden. Dies geschah unter Anwendung der Variationsstatistischen Methode Johannsens (9). Voran mußte eine Zusammenfassung der Varianten nach Eigenschaften gehen unter der Anwendung von bestimmten Klassenspielfräumen innerhalb eines Merkmals. Diese Einengung der Varianten in bestimmte Grenzen barg einen gewissen Fehler in sich, den Johannsen durch die Sheppardsche Korrektur zu tilgen empfiehlt. Versuche, die ich in dieser Richtung für alle Spielraumgrößen anstellte, ergaben nur sehr geringe Verbesserungen der gefundenen Werte, selbst bei großen Spielräumen.

Aus den aufgestellten Variationskurven wurden nun folgende Werte ermittelt:

1. der Mittelwert M ,
2. die Standardabweichung σ ,
3. der Variationskoeffizient V
und ihre mittleren Fehler.

Um den Mittelwert einer Variantenreihe zu finden, wurde von einem angenommenen Mittelwert A ausgegangen und dieser dann um die Abweichung b korrigiert, deren Errechnung Johannsen angibt. Also: $M = A + b$.

Als Maß der Variabilität dient Johannsen die Standardabweichung, das ist „die Quadratwurzel des durchschnittlichen Quadrates aller Abweichungen vom Mittel“. Ihre Begründung findet sie in der „Methode der kleinsten Quadrate“: „Die Quadratsumme der Abweichungen ist am kleinsten mit dem Mittelwert als Ausgangspunkt für die Messungen.“ (Johannsen, Elemente S. 41 ff.)

Die Standardabweichung charakterisiert also den mittleren Fehler der Einzelbeobachtung vom Mittelwerte aus und gibt damit einen Überblick über den Grad der Streuung einer Variantenreihe.

Unter der großen Zahl der bisher angewandten Bestimmungswerte der Variabilität, wie sie sich von den Biometrikern noch erhalten haben (Quartil, Modus, Variationsweite u. a.) findet sie in der modernen Biologie am meisten Anwendung. Ihre Berechnung gründet sich auf die Formel:

$$\sigma = \pm \sqrt{\frac{\sum pa^2}{n} - b^2}$$

Sie geht vom arithmetischen Mittel aus, quadriert alle Klassenabweichungen von ihm und multipliziert diese Quadrate mit der Zahl der Varianten innerhalb der Klasse. Die Summe dieser Zahlen wird durch die Anzahl aller Individuen dividiert, um auf die durchschnittliche Einzelvariante zurückzukommen, und aus diesem Ergebnis dann die Quadratwurzel gezogen.

Während bei wissenschaftlichen Berechnungen statt der Individuenzahl n der Wert $n-1$ gebräuchlich ist, wurde er hier nicht angewandt, weil diese Verminderung bei so hohen Größen, wie sie die Individuenzahl 240 darstellt, keine gewichtigere Besserung bedeutet.

Als Vergleichsmaß ist die Standardabweichung an sich nicht verwertbar; sie ist abhängig von der jeweiligen Höhe der durch sie charakterisierten Varianten. Der Variationskoeffizient V dagegen stellt diese Verbindung beider Größen dar, er ist das prozentische Verhältnis der Standardabweichung zu ihrem Mittelwert und darum das beste Vergleichsmaß der Variabilität mehrerer Eigenschaften.

Er errechnet sich nach der Formel:

$$V = \frac{100 \cdot \sigma}{M}$$

Für sämtliche errechneten Werte wurden auch ihre Fehlergrenzen berechnet: Alle auf einer willkürlichen Zahl von Beobachtungen beruhenden Untersuchungen sind dem „Gesetz der zufälligen Ursachen“ ausgeliefert; wir wissen nicht, ob die gefundenen Werte den tatsächlichen entsprechen, die wir erhalten würden, wenn die Zahl der Beobachtungen bis an die Grenze des Unendlichen wächst.

Ausgehend von der Standardabweichung, dem mittleren Fehler der Einzelvariante, begrenzte die Mathematik diese Fehlermöglichkeit in folgender Form:

$$\begin{aligned} \text{mittl. Fehler des Mittelwerts:} \quad m(M) &= \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ \text{„ „ der Standabweichung:} \quad m(\sigma) &= \pm \frac{\sigma}{\sqrt{2n}} \\ \text{„ „ des Variationskoeffizienten:} \quad m(V) &= \pm \frac{V}{\sqrt{2n}} \end{aligned}$$

Alle Werte, in Gemeinschaft mit diesen ihren mittleren Fehlern angegeben, haben Anspruch auf Zuverlässigkeit.

Unter jeder Tabelle wurde, um die Höhe der Fehler bei den einzelnen Eigenschaften zu charakterisieren, außerdem der durchschnittliche mittlere Fehler D_m in Prozenten des zugehörigen Wertes angegeben, wie es Roemer (16) für Mittelwerte im „Feldversuch“ empfiehlt. Von geringem Wert ist dies Verfahren bei σ und V , weil hier der mittlere Fehler nach der Proportion

$$\frac{m(\sigma)}{\sigma} = \frac{\sigma}{\sqrt{2n} \cdot \sigma} \text{ bzw. } \frac{m(V)}{V} = \frac{M \cdot 100 \cdot \sigma}{100 \cdot \sigma \cdot M \cdot \sqrt{2n}}$$

nichts darstellt als das konstante Verhältnis $\frac{1}{\sqrt{2n}}$

Sämtliche bei der Ausrechnung der Vergleichswerte und ihrer Fehler nötigen Multiplikationen, Divisionen und Radizierungen wurden mit der 7-stelligen Logarithmentafel von Vega vorgenommen und doppelt kontrolliert.

Für die Beurteilung der Sorten nach ihren einzelnen Eigenschaften ist es von Wichtigkeit zu wissen, ob diese Merkmale hohen oder nur geringen Schwankungsausmaßen der beiden extremen Sorten unterliegen. In welchem Verhältnis steht die Spanne zwischen dem höchsten und niedrigsten Sortenmittel zu der allgemeinen Höhe der Eigenschaft? Werden sich in ihr gesicherte Sortenunterschiede klar herausheben oder herrscht eine annähernde Gleichheit aller Sorten?

In zwei Tabellen vor der Besprechung der einzelnen Eigenschaften findet sich eine Übersicht über den Grad der

Schwankungen in den einzelnen Eigenschaften, und zwar wurde die Spanne zwischen dem höchsten und niedrigsten Mittelwert gleichzeitig in Prozenten dieser beiden Werte ausgedrückt.

Wenn auch das Schwankungsausmaß und sein prozentisches Verhältnis zu der allgemeinen Höhe der Eigenschaft bis zu gewissem Grade schon einen Schluß auf die Höhe der vorhandenen Sortenunterschiede erlaubt, so kann doch die Verteilung der Sorten innerhalb der Spanne mehr oder weniger stark nach dem einen oder anderen Extrem hinneigen; es muß also noch ein Wert geschaffen werden, der es ermöglicht, auch innerhalb der Spanne die Sicherungsgrenzen für die Sortenunterschiede festzulegen: beim Vergleich zweier Werte wurde daher der mittlere Fehler der Differenz $m_{\text{Diff}} = \sqrt{m_1^2 + m_2^2}$ zur Anwendung gebracht, und zwar wurden Differenzen nach Johannsen als gesichert erachtet, die größer waren als der doppelte mittlere Fehler der Differenz. Die Forderungen der Wissenschaft schwanken in dieser Beziehung zwischen dem einfachen und dreifachen Fehler der Differenz. [s. Roemer (15), Quante (12)].

Alle in der Tabelle wie im Text angegebenen Sicherungsgrenzen beziehen sich auf die in der zugehörigen Eigenschaftstabelle prozentisch höchsten Fehler, weil bei kleineren Fehlern der mittlere Fehler der Differenz sich nur verringern kann, somit also die Unterschiede sogar in noch geringeren Grenzen als schon genügend gesichert betrachtet werden können.

Um aber auch ganz allgemein über die Feststellung von einzelnen Sortenunterschieden hinausgehend ein Bild von der Höhe und Zahl der gesicherten Differenzen innerhalb einer Eigenschaftstabelle zu bekommen, wurde der Schwankungskoeffizient S nach Moldenhauer (11) errechnet. Er gibt an, wie stark die Differenz zwischen einer Einzelsorte und dem Mittel aller Sorten durch den mittleren Fehler der Differenz gesichert ist. Dieser Schwankungskoeffizient S wurde nun bei allen Eigenschaften für jede Sorte ermittelt und innerhalb der einzelnen Eigenschaften sodann aus den einzelnen Schwankungskoeffizienten der mittlere Schwan-

kungskoeffizient S gebildet. Dieser drückt den allgemeinen Grad der Sicherung der Sortenunterschiede bei einer Eigenschaft aus; ist er hoch, so werden Sortenverschiedenheiten bei diesem Merkmal am gesichertsten hervortreten, niedrige Schwankungskoeffizienten zeigen dagegen nur einen geringen Grad der Sicherung der Sortenunterschiede an.

In den Übersichtstabellen wurden, um das abgestufte Verhältnis der Sortenunterschiede noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, der jeweils höchste Schwankungskoeffizient in einer besonderen Spalte = 100 gesetzt und alle übrigen auf ihn bezogen. Hierbei ergab sich, daß bei den Mittelwerten fast durchgehend die Höhe der Sicherung im umgekehrten Verhältnis zu der Höhe des in Prozenten ausgedrückten mittleren Fehlers steht; bei den Variationskoeffizienten, bei denen der prozentische mittlere Fehler in allen Eigenschaften der gleiche ist, ließ sich eine ähnliche Beziehung nicht feststellen.

Als Abschluß dieser Skizze des Untersuchungsganges ist es noch notwendig, einige prinzipielle Fragen zu erörtern.

Die Zahl der zu verarbeitenden Individuen fand ihre theoretische Begrenzung in der Erwägung mehrerer Forscher, daß sich der Charakter einer Variantenreihe gleichartiger Objekte über eine bestimmte Zahl hinaus nicht mehr ändere: Lipmann (10) findet sie zwischen 35 und 40 liegend, Stieda und v. Neergard, die Roemer (15) in seinen „Variabilitätsstudien“ zitiert, begnügen sich schon mit 10 vollkommen gleichartigen Individuen. Die in dieser Arbeit angestrebte Zahl von 240 Pflanzen ergab sich einmal aus der Zahl der tatsächlich erhaltenen unmodifizierten Normalpflanzen, dann aber aus dem Bestreben heraus, durch eine hohe Zahl von Individuen eine graphische Darstellung möglichst vollkommen zu gestalten. Dies Ziel würde sich für Wintergerste aber nur, wie das Ergebnis zeigte, durch eine weit höhere Variantenanzahl erreichen lassen.

Ferner ergab sich die Frage nach den Ausdeutungsgrenzen der Ergebnisse. Reine Linien im Sinne Johannsens finden sich nicht unter den untersuchten Sorten und Stämmen, sie alle stellen Gemische von Linien, also Populationen dar.

Es erklärt sich dies aus den Blühverhältnissen bei den vielzeiligen Gersten: Nach der Selbstbestäubung, die schon im letzten Stadium des Schossens eintritt, findet fast stets, besonders aber in trockenen, warmen Sommern noch ein offenes Abblühen statt, bei dem Fremdbestäubung noch eintreten kann. Es wird also Homozygotie niemals mit Sicherheit rein vererbt werden können, wenn sie auch beim Ausgangsmaterial für die Züchtung vorhanden war, wie einige Züchter dies durch private Mitteilung angaben. Damit ist entschieden, daß wir nur Populationen vor uns haben können.

Dadurch fiel auch die Möglichkeit der Feststellung korrelativer Variabilität fort; diese kann nur an der erblichen Variabilität reiner Linien, nicht aber an der von Linien gemischten gefunden werden. Die Untersuchungen konnten sich daher lediglich auf die Höhe der allgemeinen Variabilität erstrecken. Ihr Schwankungsausmaß, verglichen mit der Höhe der Unterschiede der Mittelwerte bei den einzelnen Eigenschaften, mußte allein dazu dienen, den Ausschlag für die Eignung des einen oder anderen Merkmals als Auslesemoment zu geben.

Der Zweckmäßigkeit halber wurde daher die Besprechung der Variabilitätsverhältnisse mit der der Mittelwerte im Text verbunden.

Bei den einzelnen Merkmalen wurden immer einige wichtige Vergleichseigenschaften mit ihren Rangordnungen (R. O.) in die Tabelle mit eingestellt. Es geschah dies aus der Erwägung heraus, daß es, wenn sich auf der Basis Populationsvariabilität echte korrelative Variabilität auch nicht feststellen ließ, für den Züchter doch von Wert ist zu sehen, mit welchen anderen Eigenschaften er bei der Beurteilung einzelner Merkmale noch zu rechnen hat.

Eine Methode von Holdefleiß (7) gibt hier die Möglichkeit, in gewisser Hinsicht den Grad und Verlauf dieser Beziehungen der Eigenschaften zueinander festzulegen: Sie vergleicht zwei Eigenschaften miteinander nach ihrer Rangordnungen. Stimmen diese weitgehend überein, so herrscht Gleichsinnigkeit der Beziehungen, stehen die Rangordnungen zueinander im umgekehrten Verhältnis, so ist die Gegensinnigkeit des Verhaltens beider Eigenschaften offenbar,

während das wechselvolle Zusammentreten ganz beliebiger Rangordnungszahlen gegen das Vorhandensein einer Beziehung spricht.

Diese Erwägungen werden nun in der angewandten Methode folgendermaßen verwertet: Es werden die Differenzen der beiden Rangordnungen Stufe für Stufe ermittelt (DZ in den Tabellen) und diese dann ohne Rücksicht auf das Vorzeichen addiert.

Zur Erläuterung mögen zwei Beispiele dienen, bei denen die Rangordnungen von vier Sorten verglichen werden:

Beispiel I.

$$\begin{array}{rcl} 1 & 1 & = 0 \\ 2 & 2 & = 0 \\ 3 & 3 & = 0 \\ 4 & 4 & = 0 \\ \hline & & 0 \end{array}$$

Beispiel II.

$$\begin{array}{rcl} 1 & 4 & = -3 \\ 2 & 3 & = -1 \\ 3 & 2 & = 1 \\ 4 & 1 & = 3 \\ \hline & & 8 \end{array}$$

Beispiel I zeigt völlig gleichen Verlauf der Rangordnungen, die Summe der Rangordnungsdifferenzen ist gleich 0, während die Umkehrung der Rangordnungen in Beispiel II die höchstmögliche Summe der Differenzen beider Rangordnungen = 8 darstellt. Diese Maximaldifferenz zweier entgegengesetzt verlaufender Rangordnungen beträgt bei 19 Sorten 180, es besteht also bei 180 Gegensinnigkeit der Beziehungen, während am Nullpunkt Gleichsinnigkeit herrscht. Der Wendepunkt zwischen beiden Beziehungen liegt bei 90, der Hälfte der Maximaldifferenz. Um die Summe der Rangordnungsdifferenzen — im Text kurz: die Differenzzahl — 90 herum fehlt jede Beziehung zwischen den verglichenen Eigenschaften, das Zunehmen der Differenzzahl von 90 bis 180 ergibt den Übergang vom Fehlen jeder Beeinflussung über leidliche Gegensinnigkeit zur ausgesprochenen Gegensinnigkeit, das Abnehmen nach dem Nullpunkt hin deutet auf Gleichsinnigkeit.

Es wurde nun systematisch jede der 12 Eigenschaften mit den übrigen 11 in Vergleich gestellt, jedoch wurden in den Tabellen nur immer einige wichtige Vergleichseigenschaften aufgeführt, die zu der jeweils untersuchten in einem gewissen Verhältnis stehen.

Uebersicht über die Sortenschwankungen und die Erken Mittel

	m (M) o/o	Niedrig- ster M	Höchster M	M-Spanne	Spann- zum ni- rigster o/o
Länge des längsten Halmes	0,17	118,04	142,77	24,73	21
Anzahl der Halme	1,85	5,46	7,36	1,90	35
Gewicht der ganzen Pflanze	2,09	19,75	25,31	5,56	28
Spindellänge	0,59	6,62	7,63	1,01	15
Aehrchenzahl	0,63	19,49	23,14	3,65	19
Aehrendichte D.	0,28	28,08	32,51	4,43	16
Kornzahl des längsten Halmes	0,88	45,73	56,18	10,45	23
Korngewicht des längsten Halmes	1,14	1,88	2,52	0,64	34
Gesamtkornzahl	2,14	233,50	298,37	64,87	28
Gesamtkorngewicht	2,16	10,09	12,18	2,09	21
Tausendkorngewicht	0,71	38,98	47,31	8,33	21
Kornprozent	0,55	45,89	52,25	6,36	14

Uebersicht über die Sortenschwankungen und die Erken Variation

	m (V) o/o	Niedrigster V	Höchster V	V-Spanne
Länge des längsten Halmes	4,77	1,75	3,76	2,01
Anzahl der Halme	4,77	18,28	36,93	18,65
Gewicht der ganzen Pflanze	4,77	23,32	41,96	18,64
Spindellänge	4,77	7,10	11,71	4,61
Aehrchenzahl	4,77	7,71	11,22	3,51
Aehrendichte D.	4,77	2,54	6,42	3,88
Kornzahl des längsten Halmes	4,77	11,27	16,12	4,85
Korngewicht des längsten Halmes	4,77	13,00	20,80	7,80
Gesamtkornzahl	4,77	24,86	42,36	17,50
Gesamtkorngewicht	4,77	24,34	43,14	18,80
Tausendkorngewicht	4,77	7,07	14,43	7,36
Kornprozent	4,77	5,81	12,35	6,54

barkeit von gesicherten Sortenunterschieden bei den werten.

Spanne zum höch- sten M o/c	Schwan- kung der Sorten	Doppelter m _{Diff}	mittl. Schwankungs- koeffizient S.	Schwankungs- koeffizient S. in % d. höchst. S	Erkennbarkeit gesicherter Sortenunterschiede
17	mittel	0,88	17,03	100,0	sehr gut
26	hoch	0,4	4,15	24,4	ausreichend
22	hoch	1,7	2,42	14,2	sehr gering
13	gering	0,15	5,67	33,2	gut
16	gering	0,4	5,51	32,4	gut
14	gering	0,35	9,52	55,8	sehr gut
19	mittel	1,6	5,03	29,5	ausreichend
25	hoch	0,08	5,34	31,3	gut
22	hoch	18,0	3,10	18,2	gering
17	mittel	0,8	2,40	14,1	sehr gering
18	mittel	1,0	5,18	30,4	gut
12	gering	1,0	4,42	25,9	ausreichend

barkeit von gesicherten Sortenunterschieden bei den koeffizienten.

V-Steig- erung o/o	Schwan- kung der Sorten	Doppelter m _{Diff}	mittl. Schwankungs- koeffizient S	Schwankungs- koeffizient S. in % d. höchst. S	Erkennbarkeit gesicherter Sortenunterschiede
115	hoch	0,44	4,01	100	sehr gut
102	hoch	4,42	3,66	91	sehr gut
80	mittel	5,04	2,96	74	gut
65	mittel	1,45	2,39	60	gut
45	gering	1,31	1,78	44	ausreichend
153	hoch	0,61	3,58	89	sehr gut
43	gering	2,00	1,96	49	ausreichend
60	mittel	2,58	2,00	50	ausreichend
70	mittel	5,10	2,67	67	gut
78	mittel	5,28	2,84	71	gut
104	hoch	1,57	2,59	65	gut
113	hoch	1,31	3,73	93	sehr gut

Rang-Nr.	Name	M	m (M)	σ	m (σ)	Gruppe	Anzahl der Halme (*) **) Ro DZ	Gesamtkornzahl	Gesamtkorngewicht	Kornprozent	Spindel- länge
		cm	+	+	+		M	DZ	g	DZ	cm
1	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	118,04	0,180	3,015	0,127	kurz	17 — 166,74	15 — 14279,43	16 — 1511,62	4 — 347,30	12 — 117,21
2	197 ₂₂	121,86	0,184	2,879	0,130	"	14 — 126,41	10 — 8258,12	19 — 1712,18	19 — 1752,25	2 — 06,71
3	Janetzki's späte	124,89	0,301	4,005	0,213	"	3 — 05,53	1 — 2233,50	6 — 310,62	1 — 245,89	13 — 107,31
4	Egidl	125,65	0,222	3,271	0,157	"	19 — 157,36	18 — 14294,50	15 — 1111,45	9 — 549,00	7 — 37,03
5	Hanses Hüblitzer	126,23	0,243	3,424	0,171	"	16 — 116,70	12 — 7269,95	5 — 010,50	8 — 348,88	3 — 26,82
6	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	126,63	0,262	3,798	0,185	mittel	13 — 76,38	11 — 5258,38	7 — 110,63	16 — 1050,27	6 — 06,99
7	Eckendorfer	127,93	0,152	2,351	0,107	lang	18 — 116,77	16 — 9286,63	12 — 511,30	17 — 1050,83	9 — 27,19
8	Friedrichswerther Berg	127,95	0,284	4,106	0,201	"	11 — 36,29	19 — 11298,57	17 — 912,10	15 — 749,67	17 — 97,57
9	Janetzki's frühe	129,01	0,169	2,401	0,119	"	5 — 45,63	4 — 5242,45	1 — 810,09	18 — 951,26	11 — 27,21
10	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	129,21	0,325	4,864	0,230	"	7 — 35,71	7 — 3250,58	3 — 710,18	13 — 349,38	10 — 07,21
11	Dr. Grundmann's Wotan	129,22	0,146	2,255	0,103	"	6 — 55,70	9 — 2256,25	8 — 310,65	10 — 149,10	14 — 37,32
12	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	130,03	0,160	2,374	0,113	"	2 — 105,48	3 — 9240,05	4 — 810,43	7 — 548,40	8 — 47,14
13	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliep- hackes 2 zl.)	130,11	0,159	2,431	0,113	"	1 — 125,46	8 — 5256,01	14 — 111,41	11 — 249,20	18 — 57,62
14	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	132,88	0,219	3,165	0,155	"	8 — 65,75	2 — 12236,35	9 — 510,92	14 — 049,55	5 — 96,96
15	Ackermann's Viktoria	133,06	0,241	3,659	0,171	"	10 — 56,27	5 — 10245,13	2 — 1310,17	2 — 1346,69	4 — 116,88
16	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	134,38	0,276	4,059	0,195	lang	15 — 16,50	14 — 2278,36	18 — 212,15	5 — 1148,26	1 — 156,62
17	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	134,48	0,187	2,729	0,133	"	4 — 135,63	6 — 11249,86	10 — 711,14	12 — 549,29	15 — 27,46
18	Strengs	134,57	0,261	4,045	0,185	"	9 — 96,01	13 — 5277,42	13 — 511,38	3 — 1546,72	16 — 27,54
19	Egflinger	142,77	0,263	3,733	0,186	"	12 — 76,30	17 — 2288,47	11 — 811,27	6 — 1346,34	19 — 07,21
		Dm (M) = 0,17°/10					150	136	128	134	90

*) RO = Rangordnung.

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen.

Die Auswertung der Ergebnisse.

Länge des längsten Halmes.

(Tabelle Ia.)

Die Halmlänge eines voll ausgeschößten Pflanzenbestandes spielt in der Zuchtpraxis eine gewisse Rolle: Als augenfälliges Merkmal gibt sie dem Züchter in erster Linie einen Hinweis auf die Ausgeglichenheit seines Zuchtproduktes; ferner aber strebt die Züchtung aller Getreidearten, so auch der Wintergerste, Kürze des Strohs der besseren Lagerfestigkeit wegen an. Nur wenige Sorten weichen stark von diesem Zuchtziel ab, im allgemeinen sind die Schwankungen in der Halmlänge bei den untersuchten Sorten im Verhältnis zu anderen Eigenschaften nur mittelgroß.

Es finden sich Längenunterschiede in gleichmäßiger Zunahme von 118 cm bei Stamm 27₂₁ bis zu 142 cm bei Eglfinger, also um eine Spanne von 24 cm, die 21% der kürzesten und 17% der längsten Sorte beträgt. Der mittlere Fehler ist bei der Halmlänge am geringsten, er beträgt durchschnittlich nur 0,17%. Sortenunterschiede über 0,88 cm sind auf Grund des doppelten mittleren Fehlers der Differenz als gesichert anzusehen. Der mittlere Schwankungskoeffizient $S = 17,03$ deutet schon rein zahlenmäßig auf einen sehr hohen Grad der Sicherung, und in der Tat lassen sich bei den Sorten die Verschiedenheiten in der Halmlänge am schärfsten erkennen.

Um zusammengehörige Sorten besser zusammenfassen zu können, wurde bei allen Mittelwerten und Variationskoeffizienten an der Spanne der extremen Werte eine Dreiteilung vorgenommen: Die Gruppe „mittellang“ von 126 bis 134 cm war mit 10 Sorten am stärksten vertreten, „kurze“ Sorten unter 126 cm Länge dagegen nur mit 5, während als „lang“ vier Sorten anzusprechen waren.

Auffällig ist die starke Längenabweichung vom Mittel der Sorten bei Eglfinger mit 142 cm. Sie scheint Sorteneigentümlichkeit zu sein, jedenfalls ist sie weder durch verhältnismäßig höhere Modifikabilität — σ ist nur mittelhoch — noch durch längere Wachstumsdauer zu erklären. Zwischen

Mittelwert und der Höhe der Standardabweichung kommen alle Kombinationen vor: so hat Stamm 27₂₁ bei extrem kurzer Halmlänge eine hohe Standardabweichung; der Stamm zeigte auch auf dem Felde noch starke Verschiedenheit in der Halmlänge. Dagegen erwiesen sich die Stämme 41₂₂ und 48₂₂ mit geringer Standardabweichung sowohl im Zuchtgarten als auch im größeren Bestande als äußerst konstant.

Bei Gegenüberstellung der Halmlänge mit den anderen untersuchten Eigenschaften ließ sich eine Parallelität nicht feststellen, auch nicht mit der Spindellänge; es kommen langer Halm und kurze Ährenspindel und das umgekehrte Verhältnis in gleicher Weise vor. Gegensinnige Beziehung findet sich dagegen zur Anzahl der Halme, wie die Differenzzahl 150 zeigt; es scheint also, bei einer Reihe von Sorten

Tabelle 1b.
Variabilität der Länge des längsten Halmes.

Rang Nr.	Name	V	m (V) ±	M	m (M) ±	Gruppe
1	Dr. Grundmanns Wotan	1,75	0,080	129,22	0,146	niedrig
2	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	1,82	0,087	130,03	0,160	"
3	Eckendorfer	1,84	0,084	127,93	0,152	"
4	Janetzkis frühe	1,86	0,092	129,01	0,169	"
5	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	1,87	0,087	130,11	0,159	"
6	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	2,03	0,099	134,48	0,187	"
7	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	2,36	0,107	121,86	0,184	"
8	199 ₂₂ "	2,38	0,117	132,88	0,219	"
9	27 ₂₁ "	2,55	0,108	118,04	0,180	mittel
10	Egild	2,60	0,125	125,65	0,222	"
11	Eglfinger	2,61	0,130	142,77	0,263	"
12	Hanses Hübitzer	2,71	0,136	126,23	0,242	"
13	Ackermanns Viktoria	2,75	0,128	133,06	0,241	"
14	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	3,00	0,146	126,63	0,262	"
15	Strengs	3,01	0,137	134,57	0,261	"
16	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	3,02	0,145	134,38	0,276	"
17	Friedrichswerther Berg	3,21	0,157	127,95	0,284	hoch
18	Janetzkis späte	3,22	0,171	124,89	0,301	"
19	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	3,76	0,178	129,21	0,325	"
			Dm (V) =4,77%		Dm (M) =0,17%	

wenigstens, die Halmlänge durch stärkere Bestockung beeinträchtigt zu sein und umgekehrt. Gegensinnig verhält sich nach der Differenzzahl 136 die Halmlänge zur Gesamtkornzahl, desgleichen, aber nur angedeutet, zum Gewicht der ganzen Pflanze (Differenzzahl 126), zum Gesamtkorngewicht (Differenzzahl 128) und zum Kornprozent (Differenzzahl 134). Feste Beziehungen lassen sich daraus aber nicht ableiten.

Variabilität der Länge des längsten Halmes.
(Tabelle Ib.)

Im Verhältnis zu den hohen Mittelwerten sind die Variationskoeffizienten der Halmlänge niedrig, sie gehören zu den geringsten bei allen Eigenschaften. Wir finden Schwankungen bei V von 1,75 bei Dr. Grundmanns Wotan bis 3,76 bei Stamm 194₂₂, also eine Steigerung um 115% oder über das Doppelte des niedrigsten V. Der doppelte mittlere Fehler der Differenz ist hier mit 0,44 cm am niedrigsten von allen Eigenschaften und gestattet, wie es der mittlere Schwankungskoeffizient $S = 4,01$, der bei V ebenso wie beim Mittelwert an höchster Stelle steht, anzeigt, noch ein weitgehendes Erfassen der Sortenunterschiede. Die zur Gruppenbildung vorgenommene Dreiteilung der Spanne zwischen dem höchsten und niedrigsten Variationskoeffizienten verteilt die Mehrzahl der Sorten gleichmäßig auf die Gruppen „niedrig“ und „mittel“, während auf die Gruppe „hoch“ nur drei Sorten entfallen, Friedrichswerther Berg, Janetzki's späte W.G. und Stamm 194₂₂. Sie müssen in unserem Sinne als unausgeglichen in Bezug auf die Halmlänge angesprochen werden. Ihre höhere Modifikabilität verdanken die drei Sorten wohl ihrer längeren Wachstumsdauer, sie haftet ihnen in derselben Weise auch bei anderen Eigenschaften an.

Eine parallele Beziehung zwischen hohem Mittelwert und hohem Variationskoeffizienten läßt sich nicht feststellen, es bietet sich vielmehr ein wechselvolles Bild aller Kombinationen, denn zu gleichen Mittelwerten gehören oft sehr ungleich hohe Variationskoeffizienten.

Tabelle IIa.

Anzahl

Rang-Nr.	Name	M	m(M) ±	σ ±	m (σ) ±	Gruppe	Spindel- länge		
							*) RO	**) DZ	cm M
1	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	5,46	0,081	1,232	0,057	niedrig	18	—17	7,62
2	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	5,48	0,090	1,336	0,064	"	8	— 6	7,14
3	Janetzkis späte	5,53	0,149	1,980	0,105	"	13	—10	7,31
4	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	5,63	0,101	1,474	0,072	"	15	—11	7,46
5	Janetzkis frühe	5,63	0,108	1,543	0,077	"	11	— 6	7,21
6	Dr. Grundmanns Wotan	5,70	0,099	1,536	0,070	"	14	— 8	7,32
7	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	5,71	0,141	2,107	0,100	"	10	— 3	7,21
8	199 ₂₂ "	5,75	0,074	1,063	0,052	"	5	— 3	6,96
9	Strengs	6,01	0,114	1,763	0,080	"	16	— 7	7,54
10	Ackermanns Viktoria	6,27	0,151	2,293	0,107	mittel	4	— 6	6,88
11	Friedrichswerther Berg	6,29	0,089	1,289	0,063	"	17	— 6	7,57
12	Eglfinger	6,30	0,125	1,774	0,088	"	19	— 7	7,63
13	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	6,38	0,134	1,937	0,094	"	6	— 7	6,99
14	197 ₂₂ "	6,41	0,104	1,632	0,074	"	2	—12	6,71
15	184 ₂₂ "	6,50	0,141	2,073	0,099	"	1	—14	6,62
16	Hanses Hübitzer	6,70	0,087	1,225	0,061	"	3	—13	6,82
17	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	6,74	0,144	2,415	0,102	hoch	12	— 5	7,21
18	Eckendorfer	6,77	0,110	1,704	0,078	"	9	— 9	7,19
19	Egild	7,36	0,110	1,626	0,078	"	7	—12	7,03
		Dm(M) 1,850%						162	

*) RO = Rangordnung.

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen.

Je geringer die Schwankungen sind, desto wertvoller sind für die Sortencharakterisierung die hohen bzw. niedrigen Längenmaße. Wie schon gesagt, gehört die Halmlänge, verglichen mit den anderen Eigenschaften zu der Gruppe mit den geringsten Variationskoeffizienten. Es werden sich an ihr, weil ihre Modifikabilität gering ist, Aufspaltungen an der ausgewachsenen Pflanze leicht schon auf dem Felde erkennen lassen, und in der Erzüchtung einer bestimmten Halmlänge wird sich eher eine Konstanz erzielen lassen, als dies bei anderen Eigenschaften der Fall ist.

der Halme.

Ährchen- zahl			Kornzahl des längst. Halmes			Korngew. des längst. Halmes			Tausendkorn- gewicht			Gesamtkorn- zahl		
RO	DZ	M	RO	DZ	M	RO	DZ	M	RO	DZ	$\frac{g}{M}$	RO	DZ	M
18	— 17	23,11	19	— 18	56,18	19	— 18	2,52	15	— 14	44,51	8	— 7	256,01
14	— 12	21,97	11	— 9	52,33	11	— 9	2,28	14	— 12	43,83	2	— 1	240,05
11	— 8	21,53	10	— 7	51,99	17	— 14	2,45	17	— 14	45,37	1	2	233,50
16	— 12	22,42	16	— 12	54,46	18	— 14	2,46	16	— 12	44,53	6	— 2	249,86
13	— 8	21,83	5	0	49,29	3	2	2,03	9	— 4	41,75	4	1	242,45
15	— 9	22,13	14	— 8	53,09	13	— 7	2,29	12	— 6	42,28	9	— 3	256,25
17	— 10	23,05	15	— 8	53,60	12	— 5	2,28	6	1	40,90	7	0	250,58
2	6	20,22	6	2	50,12	16	— 8	2,33	18	— 10	46,78	2	6	236,35
12	— 3	21,75	12	— 3	52,38	9	0	2,26	11	— 2	42,06	13	— 4	277,42
1	9	19,49	1	9	45,73	4	6	2,04	7	3	40,96	5	5	245,13
19	— 8	23,14	18	— 7	55,43	14	— 3	2,30	5	6	40,80	19	— 8	298,37
10	2	21,50	17	— 5	55,13	10	2	2,26	1	11	38,98	17	— 5	288,47
4	9	20,66	8	5	50,78	8	5	2,25	8	5	41,63	11	2	258,38
3	11	20,64	4	10	48,56	7	7	2,25	19	— 5	47,31	10	4	258,12
9	6	21,44	13	2	52,39	15	0	2,32	13	2	43,60	14	1	278,34
7	9	21,18	2	14	47,15	1	15	1,88	2	14	39,03	12	4	269,95
5	12	20,76	9	8	51,92	6	11	2,23	10	— 7	41,93	15	2	279,43
8	10	21,43	7	11	50,36	5	13	2,05	4	14	39,64	16	2	286,63
6	13	21,17	3	16	48,40	2	17	1,90	3	16	39,08	18	1	294,50
174			154			156			158			60		

Anzahl der Halme.

(Tabelle IIa).^{*}

In der Anzahl der Halme zeigen die Sorten größere Schwankungen als in der Halmlänge. Die Bestockung steigt mit nur geringen Abstufungen ganz gleichmäßig von 5,46 Halmen bei Stamm 48₂₂ bis zu 6,77 Halmen bei Eckendorfer an, dem — etwas außenstehend — Egild mit 7,36 Halmen noch übergeordnet ist. Dieses Ausmaß der Spanne zwischen „hoch“ und „niedrig“ beträgt 35% von der Sorte mit der niedrigsten und 26% von der mit der höchsten Halmzahl gegen 21 bzw. 17% bei der Halmlänge. Erweisen sich auch die Schwankungen zwischen den extremen Sorten bezüglich

der Halmzahl nach der vorangehenden Übersichtstabelle all höher wie bei allen anderen Eigenschaften, so lassen sich doch Sortenunterschiede nur in weiteren Grenzen erkennen. Der mittlere Fehler ist hoch, er beträgt durchschnittlich 1,85% des Mittelwertes, und durch den doppelten mittleren Fehler der Differenz sind nur Sortenunterschiede zu erfassen, die höher sind als 0,4 Halme. Dem entspricht auch der mittlere Schwankungskoeffizient $S=4,15$ gegen $S=17,03$ bei der Halmlänge; er deutet damit an, daß ein klares Erfassen von Sortenverschiedenheiten im allgemeinen bei der Anzahl der Halme auf Grund der geringen Sicherung nur in weiteren Grenzen möglich sein wird als bei anderen Eigenschaften. Stark bestockte Sorten finden sich zwischen den 19 untersuchten nur 3, während der Rest zu gleichen Teilen mittlerer und schwache Bestockung aufweist.

Die Bestockungsfähigkeit ist bei Wintergerste weitgehend an die schwankenden Herbsttemperaturen gebunden, die bald an Frost grenzen im Wechsel mit ganz warmen Tagen. Und es ist auffallend, daß gerade die in der Jugendentwicklung wie auch später in der Reife frühen Sorten, Eckendorfer, Egild, Hübitzer und Stamm 27₂₁ den stärksten Bestockungsgrad aufweisen. Scheinbar besitzen diese Sorten eine höhere Sensibilität gegenüber der Einwirkung der Herbst- und Frühjahrswärme, sie vermögen sich auch bei geringeren Herbsttemperaturen noch stark zu bestocken, während sie andererseits aus demselben Grunde für ihre frühe Entwicklung keine hohen Temperaturansprüche im Frühjahr zu stellen brauchen. Zwischen starker Bestockung und Frühreife scheint hier auf Grund der Fähigkeit der Sorten, auch schon geringere Temperaturen für ihre Vegetation zu verwerten, Parallelität bedingt.

Während im Feldbestande die Bestockung auch von den Ausdehnungsmöglichkeiten abhängig ist, die der Pflanze zur Verfügung stehen, so ist dieser Fall bei dem Untersuchungsmaterial nicht gegeben, denn alle Rand- und Lückenpflanzen sind vor der Ernte streng ausgeschaltet.

Ein Zusammenhang zwischen hoher Halmzahl und hoher Standardabweichung findet sich nicht außer bei Stamm 27₂₁.

der überhaupt ein stark luxurierendes Wachstum zeigte. Wohl mag aber die höhere Standardabweichung bei einigen Sorten mit ihrem liegenden Wuchstyp zusammenhängen, denn gerade die Stämme 27₂₁, 181₂₂, 184₂₂, 194₂₂ und Janetzki's späte W. G. verbinden beide Eigenschaften in auffallender Weise. Es ist mithin anzunehmen, daß die stärkere Winkelbildung an den Seitenachsen der jungen Pflanzen von Einfluß auf die Ausbildung der zuletzt nachwachsenden Halmanlagen ist. Möglich ist beim liegenden Wuchstyp auch eine stärkere Modifizierung der jungen Pflanze durch das Einwirken der Bodenfröste, die die untersten Blattanlagen leichter vernichten können; auch unvorsichtige Hackarbeit kann den am Boden liegenden Halmtrieben eher schaden als den aufrechtstehenden und so eine Modifikation hervorrufen.

Die Eigenart der einzelnen Sorten, in der besprochenen Weise ganz verschieden auf die Boden- und Klimafaktoren zu reagieren, stempelt die Bestockung mehr als andere Eigenschaften zum Sortencharakteristikum, weniger dagegen zu einem wesentlichen Auslesemerkmal.

Man sollte annehmen, daß das Pflanzengewicht und das Gesamtkorngewicht proportional der höheren Bestockung zunehmen. Dementgegen läßt sich zwischen beiden Eigenschaften und der Halmzahl keine konstante Abhängigkeit wahrnehmen, die Differenzzahlen betragen 100 und 90, es sind also alle Kombinationen vorhanden; dagegen sind durch die Differenzzahl 60 zwischen Bestockung und Gesamtkornzahl gleichsinnige Beziehungen angedeutet. Verständlich ist es auch, daß höhere Halmzahl die Spindellänge und mit ihr die Ährchenzahl des Haupthalmes herabdrückt, die Differenzzahlen betragen hier 162 und 174. Schwache Bestockung hat eine bessere Ausbildung des Einzelhalmes zur Folge, andererseits muß mit ihr auch die Gesamtkornzahl sinken; dafür wird der durch sie erhöhte Halmertrag einen Ertragsausgleich herbeiführen. Zum Tausendkorngewicht bestehen ebenfalls gegensinnige Beziehungen.

Die Bestockung darum in optimale Grenzen weisen zu wollen, ist nach all diesen Erwägungen nicht ratsam, geringe Bestockung ist dem Risiko des Auswinterns leicht ausgesetzt,

und auch der bessere Halmertrag ist sehr von der Jahreswitterung abhängig. Im allgemeinen wird man bis zu gewissen Grenzen dem höheren Bestockungsgrade doch den Vorzug geben, der auf dem Felde sich allen Fehlstellen anpaßt und auch bei vermindertem Ertrage des Einzelhalmes durch die höhere Gesamtkornzahl den Ertrag sicherstellt.

Variabilität der Anzahl der Halme. (Tabelle IIb).

Gegen die Bestockung als Auslesemoment spricht auch, daß sie mit ihren Variationskoeffizienten ziemlich hohen Schwankungen unterliegt, während sich bei den Mittelwerten Sortenunterschiede auf Grund des zweifachen mittleren Fehlers der Differenz nur in weiteren Grenzen mit Sicherheit

Tabelle IIb.
Variabilität der Anzahl der Halme.

Rang Nr.	Name	V	m (V) ±	M	m (M) ±	Gruppe
1	Hanses Hübitzer	18,28	0,914	6,70	0,087	niedrig
2	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	18,49	0,906	5,75	0,074	"
3	Friedrichswerther Berg	20,45	1,001	6,29	0,089	"
4	Egild	22,09	1,058	7,36	0,110	"
5	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	22,57	1,046	5,46	0,081	"
6	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	24,40	1,163	5,48	0,090	"
7	Eckendorfer	25,18	1,149	6,77	0,110	mittel
8	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	25,46	1,148	6,41	0,104	"
9	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	26,19	1,272	5,63	0,101	"
10	Dr. Grundmanns Wotan	26,92	1,229	5,70	0,099	"
11	Janetzkis frühe	27,40	1,360	5,63	0,108	"
12	Eglfinger	28,12	1,399	6,30	0,125	"
13	Strengs	29,34	1,339	6,01	0,114	"
14	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	30,35	1,481	6,38	0,134	"
15	184 ₂₂ "	31,90	1,531	6,50	0,141	hoch
16	27 ₂₁ "	35,84	1,514	6,74	0,144	"
17	Janetzkis späte	35,84	1,905	5,53	0,149	"
18	Ackermanns Viktoria	36,59	1,706	6,27	0,151	"
19	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	36,93	1,745	5,71	0,141	"
		Dm (V) =4,77%		Dm (M) =1,85%		

feststellen lassen. Die Variationskoeffizienten zeigen eine Steigerung von 18,28 V bei Hübitzer um das Doppelte bis zu 36,93 V bei Stamm 194₂₂. Ist auch der mittlere Fehler mit 1,3 ziemlich hoch, so lassen sich doch noch Sortenunterschiede über 4,4 V erfassen. Diesen ziemlich hohen Grad der Sicherung bestätigt auch der mittlere Schwankungskoeffizient $S = 3,66$, der nur 9% kleiner ist als der höchste S bei V der Halmlänge. Die Gruppenverteilung ist ähnlich wie bei den Mittelwerten, die Gruppen „niedrig“ und „mittel“ teilen sich gleichmäßig in die Mehrzahl der Sorten, während nur wenige hohe Variabilität zeigen. Es sind dies die gleichen, die auch schon durch hohe Standardabweichungen hervortraten.

Eine feste Beziehung zwischen Variationskoeffizienten und Mittelwert findet sich nicht, es tritt die gleiche Halmszahl mit hohem, mittlerem und niedrigem V auf.

Damit entfällt auch die Brauchbarkeit der Bestockungsziffer für die Sortencharakteristik, ihr Wert unterliegt zu hohen Schwankungen. Die hohe Modifikabilität der Halmszahl ist im Ausnahmefall sogar erwünscht, sie gewährleistet eine bessere Anpassungsfähigkeit an die gegebenen Lebensbedingungen; darum wird man sie bis auf die zu hohen Extreme auch nicht wegzuzüchten versuchen. Die hohen Variationskoeffizienten aber beweisen erst vollends, daß die Anzahl der Halme als Auslesemoment ungeeignet ist.

Gewicht der ganzen Pflanze.

(Tabelle III a).

Das Gewicht der ganzen Pflanze steigt bei den unteruchten Sorten ganz gleichmäßig von 19,75 g bei Janetzki'scher W.G. bis zu 25,31 g bei Stamm 184₂₂, also um eine Differenz von 5,56 g oder 28% vom niedrigsten und 22% vom höchsten Pflanzengewicht. Trotz dieser hohen Schwankungen zwischen den beiden Extremen sind Unterschiede von Sorte zu Sorte nur schwer festzustellen, der (M) mit durchschnittlich 2,09% erlaubt nur über 1,7 g

Rang-Nr.	Name	M g	m(M) ±	σ +	m(σ) +	Grup- pe	Gesamt- korngewicht RO DZ M	Korn- prozent RO DZ M	Korngewicht d.längst.Halm. RO DZ M	Halmlänge RO DZ M cm	Aehren- zahl RO DZ M						
1	Janetzkis frühe	19,75	0,394	5,612	0,279	niedr.	1	0 10,09	18	1751,26	3	22,03	9	8	129,01	13	1221,83
2	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	20,49	0,515	7,708	0,364	"	3	1 10,18	13	1149,38	12	102,28	10	8	129,21	17	1523,05
3	181 ₂₂ "	20,94	0,461	6,678	0,326	"	7	4 10,63	16	1350,27	8	52,25	6	3	126,63	4	120,66
4	Hanses Hübiter	21,38	0,490	6,932	0,347	"	5	1 10,50	8	448,88	1	31,88	5	1	126,23	7	321,18
5	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	21,59	0,385	5,716	0,273	"	4	1 10,43	7	248,40	11	62,28	12	7	130,03	14	521,97
6	Dr. Grundmanns Wotan	21,65	0,387	5,989	0,273	mittel	8	2 10,65	10	449,10	13	72,29	11	5	129,22	15	922,13
7	Ackermanns Viktoria	21,65	0,588	8,917	0,416	"	2	5 10,17	2	546,69	4	32,04	15	8	133,06	1	619,49
8	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	22,23	0,416	5,997	0,294	"	9	1 10,92	14	649,55	16	82,33	14	6	132,88	2	620,22
9	Eckendorfer	22,26	0,402	6,234	0,285	"	12	3 11,30	17	850,83	5	42,05	7	2	127,93	8	121,43
10	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	22,52	0,434	6,323	0,307	"	10	0 11,14	12	249,29	18	82,46	17	7	134,48	16	622,43
11	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliep- hacker 2 zl.)	22,90	0,350	5,340	0,247	"	14	3 11,41	11	049,20	19	82,52	13	2	130,11	18	723,11
12	197 ₂₂ Eckendorfer × Schwarze)	23,17	0,400	6,271	0,283	"	19	7 12,18	19	752,25	7	52,25	2	10	121,86	3	920,64
13	Eglinger	23,18	0,544	7,731	0,385	"	11	2 11,27	6	748,34	10	32,26	19	6	142,77	10	321,50
14	Egild	23,26	0,403	5,952	0,285	"	15	1 11,45	8	649,00	2	121,90	4	10	125,65	6	821,17
15	Janetzkis späte	23,77	0,650	8,644	0,459	hoch	6	9 10,62	1	1445,89	17	22,45	3	12	124,89	11	421,53
16	Strengs	23,95	0,479	7,414	0,338	"	13	3 11,38	3	1346,72	9	72,26	18	2	134,57	12	421,75
17	Friedrichswerther Berg	24,18	0,460	6,654	0,325	"	17	0 12,10	15	249,67	14	32,30	8	9	127,95	19	223,14
18	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	24,66	0,618	10,348	0,437	"	16	2 11,62	4	1447,30	6	122,23	1	17	118,04	5	1320,76
19	184 ₂₂ "	25,31	0,629	9,260	0,444	"	18	1 12,15	5	1448,26	15	42,32	16	3	134,38	9	1021,44
			Dm (M. = 2,09%)				46	148	112	126	128						

*) RO = Rangordnung.

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen.

liegende Sortenunterschiede als gesichert anzusehen. Dementsprechend ist auch der mittlere Schwankungskoeffizient $S = 2,42$ sehr niedrig im Vergleich mit anderen Eigenschaften. Bei der Gruppenteilung zeigen 9 Sorten „mittleres“ Pflanzengewicht, während je 5 Sorten die Gruppen „hoch“ und „gering“ bilden.

Das Gesamtpflanzengewicht ist, wie die hohe Standardabweichung anzeigt, eine sehr modifikable Eigenschaft. Weiterer Standraum und damit günstigere Ernährungsbedingungen beeinflussen die Einzelpflanze leicht. Solche systematische Modifikationsursachen sind bei uns aber ausgeschaltet, die hohen Schwankungsausmaße innerhalb der Sorten sind mithin als Sorteneigentümlichkeiten anzusprechen. Erklärlich werden sie aber, wenn wir die Komponenten betrachten, die auf das Pflanzengewicht einwirken: Die Bestockung ist nur von geringem Einfluß, eine Gesetzmäßigkeit läßt sich nicht finden. Unter den 5 Sorten in der Gruppe „hoch“ finden sich 2 Sorten, von denen eine, Strengs, nur mittlere Halmzahl besitzt, während Janetzkis späte W. G. zu den schwächstbestockten gehört; und umgekehrt finden wir unter „niedrig“ die stark bestockten Sorten, Stamm 181₂₂ und Hübitzer neben Stamm 201₂₂, der in der Halmzahl unter „niedrig“ steht. Die Differenzzahl 100 deutet dieses Wechselverhältnis auch an. Was wir schon bei der Anzahl der Halme sahen, daß geringe Bestockung durch bessere Ausbildung der Halme wett gemacht würde, finden wir am Pflanzengewicht bestätigt. Janetzkis späte W. G. steht trotz geringer Halmzahl in der Gruppe „hoch“, denn sie hat einen hohen Halmertrag bei hohem Tausendkorngewicht. Gute Parallelität der Beziehungen herrscht nach der Differenzzahl 46 mit dem Gesamtkorngewicht, das bei einigen Sorten vom Tausendkorngewicht, bei anderen von hoher Gesamtkornzahl abhängt. Feste Beziehungen zur Halmlänge, wie sie Rudolf (19) bei Hafer fand, treten nicht auf, sie haben bei den für Wintergerste gefundenen Fällen nur den Wert des Zufalls. Zur Ährchenzahl und Ährchendichte ist gegensinnige Beziehung teilweise vorhanden, hervorgerufen durch den Einfluß der Bestockung.

Alle diese vielfachen und teilweise recht zufälligen Abhängigkeiten von anderen Eigenschaften lassen das Pflanzengewicht für die Sortensystematik wertlos erscheinen, wenn gleich auch jede Sorte ihre spezifische Art des Sichanpassens haben mag.

Als Beurteilungsmoment ist das Pflanzengewicht immer nur in Verbindung mit dem Gesamtkorngewicht oder auch dem Kornprozent brauchbar. Mit letzterem zeigt die Differenzzahl 149 gegensinnige Beziehung an, die sich besonders gefahrvoll für niedriges Pflanzengewicht bei hohem Kornprozent auswirkt, weil die schwächere Strohausbildung naturgemäß das Lagern unter dem höheren Gesamtkorngewicht begünstigt, während höheres Pflanzengewicht selbst bei höherem Gesamtkorngewicht noch eine gewisse Gewähr für

Tabelle IIIb.
Variabilität des Gewichts der ganzen Pflanze.

Rang Nr.	Name	V	m (V) ±	M	m (M) ±	Gruppe
1	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	23,32	1,080	22,90	0,350	niedrig
2	Egild	25,59	1,226	23,26	0,403	"
3	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	26,47	1,262	21,59	0,385	"
4	199 ₂₂ "	26,91	1,320	22,23	0,416	"
5	197 ₂₂ "	27,06	1,220	23,17	0,400	"
6	Friedrichswerther Berg	27,52	1,346	24,18	0,460	"
7	Dr. Grundmanns Wotan	27,67	1,263	21,65	0,387	"
8	Eckendorfer	28,00	1,278	22,26	0,402	"
9	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	28,07	1,363	22,52	0,434	"
10	Janetzkis frühe	28,48	1,413	19,75	0,394	"
11	Strengs	30,96	1,416	23,95	0,479	mittel
12	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	31,89	1,556	20,94	0,461	"
13	Hanses Hübitzer	32,43	1,622	21,38	0,490	"
14	Eglfinger	33,35	1,659	23,18	0,544	"
15	Janetzkis späte	36,37	1,933	23,77	0,650	hoch
16	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	36,59	1,756	25,31	0,629	"
17	194 ₂₂ "	37,60	1,777	20,49	0,515	"
18	Ackermanns Viktoria	41,19	1,920	21,65	0,588	"
19	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	41,96	1,773	24,66	0,618	"
		Dm (V) =4,77%		Dm (M) =2,09%		

eine günstigere Strohausbildung und damit auch für eine bessere Lagerfestigkeit gibt.

Variabilität des Gewichts der ganzen Pflanze. (Tabelle III b.)

Die Variationskoeffizienten sind beim Pflanzengewicht entsprechend den vorgenannten Abhängigkeitsfaktoren mit die höchsten von allen Eigenschaften. Sie steigen von 23,22 V bei Stamm 48₂₂ bis zu 41,96 V bei Stamm 27₂₁, also um 80%. Der mittlere Fehler liegt ziemlich hoch, etwa bei 1,5. Auf Grund des doppelten mittleren Fehlers der Differenz sind sicher nur die Sortenunterschiede zu erfassen, die größer sind als 5,04 V. Die allgemeine Sicherung dieser Verschiedenheiten charakterisiert der mittlere Schwankungskoeffizient $S = 2,96$, sie ist um 26% geringer als bei V der Halmlänge, bei der die Sortenunterschiede am klarsten zum Ausdruck kommen. Mehr als die Hälfte der Sorten fällt bei der Variabilität unter die Gruppe „niedrig“, während nur wenige mittlere und hohe Variationskoeffizienten zeigen.

Eine feste Beziehung zwischen Mittelwert und Variationskoeffizient tritt auch hier nicht auf. Stellenweise Übereinstimmung der Rangordnungen beider wird durch starke Abweichungen, wie sie z. B. Stamm 194₂₂ mit hohem V bei geringem M zeigt, gestört. Parallelität, wenigstens der Gruppenzugehörigen, findet sich zu den V-Rangordnungen von Halmzahl und Gesamtkornzahl, während die demgemäß auch zu erwartende Übereinstimmung mit den Variationskoeffizienten des Kornprozents nur in wenigen Fällen eintritt und zwar bei den Sorten, die in ihrer Variabilität fast stets denselben Platz belegen, z. B. Stamm 48₂₂ sehr gering, Stamm 27₂₁ unter den höchsten.

Als Auslesemoment ist das Pflanzengewicht nicht geeignet, einmal auf Grund seiner an und für sich hohen Variabilität, dann aber, weil die bei gleichen Mittelwerten sehr verschiedenen Variationskoeffizienten auf hohe Modifikabilität schließen lassen und darum den Wert ihrer Mittelwerte sehr in Zweifel setzen, letzten Endes noch, weil das Pflanzen-

Rang-Nr.	N a m e	M cm	m (M)	σ +	m (σ) +	Grup- pe	Aechren- zahl RO DZ	Kornzahl d. längst.Halm. RO DZ	Aechren- dicke RO DZ	Anzahl der Halme RO DZ	Kornpro- zent RO DZ
1	184 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	6,62	0,051	0,749	0,036	kurz	9—821,44	13—1252,39	19—1832,51	15—146,50	5—448,26
2	197 ²²	6,71	0,036	0,569	0,026		3—120,64	4—248,56	15—1380,73	14—126,41	19—1752,25
3	Hanses Hübiter	6,82	0,044	0,629	0,031	"	7—421,18	2—147,15	18—1531,05	16—136,70	8—548,88
4	Ackermanns Viktoria	6,88	0,040	0,610	0,028	"	1—319,49	1—345,73	2—228,31	10—66,27	2—246,69
5	199 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	6,96	0,034	0,495	0,024	"	2—320,22	6—150,12	1—428,08	8—35,75	14—949,55
6	181 ²²	6,99	0,054	0,777	0,038	mittel	4—220,66	8—250,78	7—129,62	13—76,38	16—1050,27
7	Egid	7,03	0,037	0,552	0,026	"	6—121,17	3—448,40	10—330,19	19—127,36	9—249,00
8	201 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	7,14	0,043	0,639	0,030	"	14—621,97	11—352,33	16—830,73	2—65,48	7—148,40
9	Eckendorfer	7,19	0,038	0,587	0,027	"	8—121,43	7—250,36	9—030,08	18—96,77	17—850,83
10	194 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	7,21	0,038	0,568	0,027	"	17—723,05	15—553,60	17—731,04	7—35,71	13—349,38
11	Janetzki's frühe	7,21	0,045	0,639	0,032	"	13—221,83	5—649,29	12—130,32	5—65,63	18—751,26
12	27 ²¹ (Eckendorfer × Schwarze)	7,21	0,050	0,844	0,035	"	5—720,76	9—351,92	4—828,81	17—56,74	4—847,30
13	Janetzki's späte	7,31	0,058	0,772	0,041	lang	11—221,53	10—351,99	6—729,48	3—105,53	1—1245,89
14	Dr. Grundhaimers Wotan	7,32	0,040	0,617	0,028	"	15—122,13	14—053,09	11—330,28	6—85,70	10—449,10
15	41 ²² (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	7,46	0,041	0,594	0,029	"	15—122,42	16—154,46	8—730,03	4—115,63	12—349,29
16	Stengs	7,54	0,040	0,620	0,028	"	12—421,75	12—452,38	5—1128,83	9—76,01	3—1346,72
17	Friedrichswerther Berg	7,57	0,041	0,595	0,029	"	19—223,14	18—155,43	14—330,52	11—66,29	15—249,67
18	48 ²² (4 ztl. aus Schliep- hackes 2 ztl.)	7,62	0,035	0,541	0,025	"	18—023,11	19—156,18	13—530,35	1—175,46	11—749,20
19	Eglinger	7,63	0,043	0,607	0,030	"	10—921,50	17—255,13	3—1628,81	12—76,30	6—1348,34
			$\overline{Dm}$ (M) = 0,59 ^{0,6}				64	56	132	162	130

*) RO = Rangordnung.

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen.

gewicht ohne den gleichfalls hochvariablen Pflanzenertrag einen praktischen Wert nicht hat.

Spindellänge des längsten Halmes. (Tabelle IVa.)

Entgegen den hohen Sortenunterschieden, die die anderen untersuchten Getreidearten in der Länge ihrer Ährenspindel aufweisen, finden wir bei Wintergerste nur geringe Abweichungen der extremen Sortenmittel voneinander. Die Spindellänge steigt von 6,62 cm bei Stamm 184₂₂ bis zu 7,63 cm bei Eglfinger, also nur um 1.01 cm oder um 15% der niedrigsten und 13% der höchsten Spindellänge. Der m (M) beträgt durchschnittlich 0,59% des Mittelwerts. Sortenunterschiede, die höher sind als 0,15 cm, können auf Grund des doppelten mittleren Fehlers der Differenz als sicher angesehen werden, auch der mittlere Schwankungskoeffizient $S = 5,67$ als Ausdruck der allgemeinen Sicherung bestätigt sie noch als gut erkennbar. Die Sorten verteilen sich gleichmäßig unter stetiger, geringer Zunahme ihres Mittelwerts auf die Gruppen „kurz“, „mittel“ und „lang“.

Die Spindellänge ist der Modifikation fast gar nicht ausgesetzt. Die Standardabweichungen liegen zwischen 0,49 und 0,77, sie zeigen auch keinerlei Zusammenhang mit ihren Mittelwerten. Der Sortencharakter kommt hier also klar zum Ausdruck, wenn auch die Unterschiede an sich gering sind. Die geringe Differenz der beiden Extreme läßt für die Aufstellung von Beziehungen zu anderen Eigenschaften zu höchster Vorsicht raten, weil die Rangordnung der Sortenmittel bei der Spindellänge nur sich sehr wenig unterscheidende Werte enthält und so leicht zu Trugschlüssen führen kann.

Daß zwischen Halm- und Spindellänge nur zufällige, gleichsinnige, aber auch gegensinnige Beziehungen bestehen, war dort durch die Differenzzahl 90 schon angedeutet. Wichtiger ist die Abhängigkeit der Spindelausbildung von der Bestockung (Differenzzahl 162), in der Regel zieht höhere Halmzahl eine Verkürzung der Ährenspindel nach sich; jedoch

finden sich auch hierin Ausnahmen, z. B. hat Egild hohe Bestockung, aber doch mittlere Spindellänge, sodaß man dadurch in der Annahme nur bestärkt wird, daß die Spindellänge eine rein erbliche Eigenschaft darstellt. Zwischen Spindellänge und Ährchenzahl besteht schwache Gegensinnigkeit der Beziehungen. Es finden sich hiervon aber ebenfalls Abweichungen: Stamm 184₂₂ hat bei kurzer Spindel mittlere Ährchenzahl, die aber durch die hohe Ährchendichte gerechtfertigt ist; die umgekehrte Erscheinung zeigt Stamm 27₂₁ mit niedriger Ährchenzahl bei mittlerer Spindellänge, aber geringer Ährchendichte. Parallel zur Ährchenzahl gehen auch die schwach gleichsinnigen Beziehungen zur Kornzahl des Haupthalmes. Die Ährchendichte, nach der Differenzzahl 132 zur Spindellänge schwach gegensinnig gerichtet, ist, obwohl

Tabelle IVb.
Variabilität der Spindellänge.

Rang Nr.	Name	V	m (V) ±	M	m (M) ±	Gruppe
1	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	7,10	0,329	7,62	0,035	niedrig
2	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	7,11	0,349	6,96	0,034	"
3	Egild	7,85	0,376	7,03	0,037	"
4	Friedrichswerther Berg	7,85	0,384	7,57	0,041	"
5	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	7,88	0,372	7,21	0,038	"
6	Eglfinger	7,95	0,396	7,63	0,043	"
7	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	7,95	0,386	7,46	0,041	"
8	Eckendorfer	8,16	0,372	7,19	0,038	"
9	Strengs	8,22	0,375	7,54	0,040	"
10	Dr. Grundmanns Wotan	8,42	0,385	7,32	0,040	"
11	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	8,47	0,382	6,71	0,036	"
12	Janetzkis frühe	8,86	0,440	7,21	0,045	mittel
13	Ackermanns Viktoria	8,88	0,414	6,88	0,040	"
14	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	8,95	0,427	7,14	0,043	"
15	Hanses Hübitzer	9,22	0,461	6,82	0,044	"
16	Janetzkis späte	10,57	0,562	7,31	0,058	hoch
17	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	11,11	0,542	6,99	0,054	"
18	184 ₂₂ "	11,32	0,543	6,62	0,051	"
19	27 ₂₁ "	11,71	0,494	7,21	0,050	"
		Dm (V) = 4,77%		Dm (M) = 0,59%		

sie an sich auch infolge ihrer geringen Schwankungen den Erbwert gut wiedergibt, stark von der Ährchenzahl abhängig. Daß sie aber auch aktiv die Spindellänge beeinflusst, zeigten die beiden Beispiele oben. Zwischen der Spindellänge und dem Tausendkorngewicht und damit der Korngröße sind durch die Differenzzahl 116 nur sehr schwach gegensinnige Beziehungen angedeutet. Bei den geringen Sortenunterschieden in der Länge der Ährenspindeln läßt sich ein direkter Einfluß eines etwa größeren Raumes für die Entwicklung des Einzelkorns auf die Korngröße nicht wahrnehmen; wo er sich doch geltend machte, ist er eher durch das Zusammenwirken von Ährchenzahl und Ährchendichte hervorgerufen. Von Spindellänge zu Kornprozent besteht schwach gegensinnige Beziehung. (Differenzzahl 130).

Variabilität der Spindellänge.

(Tabelle IV b.)

Die Variationskoeffizienten bei der Spindellänge sind niedrig, sie bewegen sich um 9 V herum. Gegenüber dem nur geringen Schwankungsausmaß zwischen den extremen Mittelwerten zeigen sie verhältnismäßig höhere Schwankungen, sie steigen von 7,10 V bei Stamm 48₂₂ bis 11,71 V bei Stamm 27₂₁, also um 65%. Der m (V) liegt im Höchsfalle bei 0,59, nur Sortenunterschiede, die höher als 1,45 V sind, werden sicher erfaßt. Der mittlere Schwankungskoeffizient $S = 2,39$ zeigt, daß die Sicherung von Sortenverschiedenheiten bei der Variabilität der Spindellänge um 40% geringer ist als bei der Hahnlänge. Bei der Gruppenteilung fallen auf die Gruppe „niedrig“ 11 Sorten, also 2 mehr als die Hälfte, während mittlere und hohe Variabilität nur je 4 Sorten haben.

Daß Stamm 27₂₁ in der Ährenlänge am unausgeglicheneren war, zeigte er schon während der Vegetation; dem entspricht auch sein besonders hoher Variationskoeffizient. Ihm nahe stehen seine Abstammungsgeschwister 181₂₂ und 184₂₂, von denen 181₂₂ mit kleinerem V bei größerem Mittelwert der bessere zu sein scheint. Janetzki's späte W.G. weist bei höherer Spindellänge doch auch große Unsicherheit der Kon-

Tabelle Va.

Aehrchen-

Rang Nr.	Name	M	m(M) ±	σ ±	m(σ) ±	Gruppe	Tauben Aehrchen		
							*) RO	**) DZ	0/0 M
1	Ackermanns Viktoria	19,49	0,143	2,174	0,101	niedrig	11	—10	19,7
2	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	20,22	0,120	1,735	0,085	"	6	—4	18,6
3	197 ₂₂ "	20,64	0,113	1,779	0,080	"	19	—16	24,7
4	181 ₂₂ "	20,66	0,154	2,235	0,109	"	2	2	15,6
5	27 ₂₁ "	20,76	0,139	2,328	0,098	"	1	4	13,0
6	Egild	21,17	0,135	1,999	0,096	mittel- hoch	17	—11	23,0
7	Hanses Hübitzer	21,18	0,145	2,051	0,103		18	—11	24,6
8	Eckendorfer	21,43	0,132	2,038	0,093	"	15	7	22,0
9	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	21,44	0,139	2,052	0,098	"	7	2	19,0
10	Eglfinger	21,50	0,143	2,033	0,101	"	4	6	16,6
11	Janetzki's späte	21,53	0,134	1,788	0,095	"	5	6	17,1
12	Strengs	21,75	0,124	1,920	0,088	"	8	4	19,0
13	Janetzki's frühe	21,83	0,146	2,087	0,104	"	16	—3	22,0
14	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	21,97	0,143	2,117	0,110	"	14	0	20,2
15	Dr. Grundmanns Wotan	22,13	0,139	2,160	0,099	hoch	13	2	20,1
16	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	22,42	0,134	1,954	0,095	"	9	7	19,1
17	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	23,05	0,125	1,868	0,088	"	10	7	19,7
18	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliep- hackes 2 zl.)	23,11	0,117	1,782	0,083	"	3	15	16,5
19	Friedrichswerther Berg	23,14	0,126	1,827	0,089	"	12	7	19,7
		Dm (M) =0,65%						124	

*) RO = Rangordnung.

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen.

stanz auf. Das starke Aufspalten in dieser Eigenschaft war bei Hübitzer auch schon während der Vegetation auffallend, sie verbindet nach den Tabellen auch zahlenmäßig sehr geringe Spindellänge mit einem hohen Variationskoeffizienten.

Ein Zusammenhang zwischen Mittelwert und Variabilität läßt sich bei keiner der Sorten begründen, es tritt bei dieser Eigenschaft die erbliche Veranlagung klar zu Tage. Feste Beziehungen zu den V-Rangordnungen anderer Eigenschaften bestehen nicht, vor allem nicht zur Halmlänge, es stimmen hier lediglich die sich in ihrer Höhe stets gleichbleibenden Extreme, Stamm 48₂₂ immer sehr gering und 27₂₁ unter den höchsten, überein. Zu der V-Rangordnung der

zahl

Kornzahl des längst. Halmes			Anzahl der Halme			Gesamtkorn- zahl			Spindellänge			Ährchen- dichte		
RO	DZ	M	RO	DZ	M	RO	DZ	M	RO	DZ	cm M	RO	DZ	M
1	0	45,73	10	— 9	6,27	5	— 4	245,13	4	—3	6,38	2	— 1	28,31
6	—4	50,12	8	— 6	5,75	2	0	236,35	5	—3	6,96	1	1	28,08
4	—1	48,56	14	—11	6,41	10	— 7	258,12	2	1	6,71	15	—12	30,73
8	—4	50,78	13	— 9	6,38	11	— 7	258,38	6	—2	6,99	7	— 3	29,62
9	—4	51,92	17	—12	6,74	15	—10	279,43	12	—7	7,21	4	1	28,81
3	3	48,40	19	—13	7,36	18	—12	294,50	7	—1	7,03	10	— 4	30,19
2	5	47,15	16	— 9	6,70	12	— 5	269,95	3	4	6,82	18	—11	31,05
7	1	50,36	18	—10	6,77	16	— 8	286,63	9	—1	7,19	9	— 1	30,08
13	—4	52,39	15	— 6	6,50	14	— 5	278,34	1	8	6,62	19	—10	32,51
17	—7	55,13	12	— 2	6,30	17	— 7	288,47	19	—9	7,63	3	7	28,81
10	1	51,99	3	8	5,53	1	10	233,50	13	—2	7,31	6	5	29,48
12	0	52,38	9	3	6,01	13	— 1	277,42	16	—4	7,54	5	7	28,83
5	8	51,99	5	8	5,63	4	9	242,45	11	2	7,21	12	1	30,32
11	3	52,33	2	12	5,48	3	11	240,05	8	6	7,14	16	— 2	30,73
14	1	53,09	6	9	5,70	9	6	256,25	14	1	7,32	11	4	30,28
16	0	54,46	4	12	5,63	6	10	249,86	15	1	7,46	8	8	30,03
15	2	53,60	7	10	5,71	7	10	250,58	10	7	7,21	17	0	31,04
19	—1	56,18	1	17	5,46	8	10	256,01	18	0	7,62	13	5	30,35
18	1	55,43	11	8	6,29	19	0	298,37	17	2	7,57	14	5	30,52
	50			174			132			64			88	

Halmzahl finden sich innerhalb der Gruppen einige Berührungspunkte, jedoch herrscht nicht die Gegensinnigkeit der Mittelwertsrangordnung. Ähnlich, aber doch mehrfach durchbrochen, ist der Vergleich mit den Variationskoeffizienten der Ährchenzahl.

Zeigt auch die Spindellänge nur geringe Sortenunterschiede und ist sie demnach auch zur systematischen Einteilung wenig zu gebrauchen, so ist sie doch als Auslesemoment gut verwendbar. Sie zeigt sehr klar bei nur mittlerer Höhe der Variationskoeffizienten die vorhandenen Aufspaltungen an und ist der Modifikation durch die Lebensbedingungen der Pflanze wenig zugänglich.

Ährchenzahl des längsten Halmes.

(Tabelle Va.)

Wie die Spindellänge weist auch die Ährchenzahl in der Tabelle der Sortenmittel nur geringe Schwankungen auf. Sie ist begrenzt von Ackermanns Viktoria mit der geringsten Ährchenzahl, 1949, und Friedrichswerther Berg mit 23,14 Ährchen an höchster Stelle. Die zwischen beiden liegende Spanne beträgt 19% des niedrigsten und 16% des höchsten Wertes. Der m (M) beträgt durchschnittlich nur 0,63% des Mittelwertes. Sortenunterschiede, die über 0,4 Ährchen liegen, sind gesichert. Auch zeigt der mittlere Schwankungskoeffizient $S = 5,51$ an, daß sich Sortenverschiedenheiten in der Tabelle in größerer Zahl gesichert vorfinden. Eine gleichmäßige Einordnung in die drei Gruppen findet nicht statt, es kommen neben mehreren Sortengleichheiten auch größere Sprünge in der Tabelle vor, z. B. bei Ackermanns Viktoria, die durch besonders geringe Ährchenzahl auffällt. Die „mittelhohe“ Gruppe umfaßt die Hälfte aller Sorten, während die Gruppen „niedrig“ und „hoch“ nur mit je 5 Sorten vertreten sind.

Schneider (21) (Über den Entwicklungsrhythmus der Fruchtstände bei Getreide) legt für Gerste — im Gegensatz zu Weizen — das Ende der Ährchenanlegung zusammen mit dem Versiegen ganz spezifischer Nährstoffaufnahme, stempelt die Ährchenzahl also zu einem hochmodifizablen Merkmal. Dieser Auffassung bieten die niedrigen Standardabweichungen keine Stütze, sie sind zudem auch nicht geringer als bei Winterweizen (dort $\sigma = 1,5-2,7$). Nach Schneiders Darlegung müßte die Modifikabilität bei Weizen ja eigentlich wesentlich geringer sein als bei Wintergerste, weil nach ihr bei Winterweizen die Ährchenanlegung in der Bildung eines Endährchens ihren Abschluß findet und dann je nach dem Vorhandensein von Nährstoffen nur noch Blütchen in den Ährchen gebildet werden. Eine gewisse Berechtigung gewinnen andererseits seine Erörterungen aber dadurch, daß die Differenzzahl 174 zur Anzahl der Halme Gegensinnigkeit anzeigt. Es hat also starke Bestockung geringere Ährchenanlegung an der höheren

Halmzahl zur Folge, ohne jedoch fest zur Regel zu werden: Friedrichswerther Berg mit mittlerer Halmzahl weist die höchste Ährchenzahl auf. Schwache Gegensinnigkeit findet sich zu den Eigenschaften, die von der Bestockung stark abhängen: Gewicht der ganzen Pflanze (Differenzzahl 128), Gesamtkornzahl (Differenzzahl 132) und Gesamtkorngewicht (Differenzzahl 124), desgleichen wird auch das Tausendkorngewicht zum Teil durch die Ährchenzahl in seiner Höhe bestimmt, wie die Differenzzahl 124 anzeigt. Daß zwischen der Ährchenzahl des Haupthalmes und der zugehörigen Kornzahl eine gewisse Gleichsinnigkeit bestehen muß, — die Differenzzahl beträgt 50 —, ist rein statistische Korrelation. Dieselben gleichsinnigen Beziehungen bestehen nach der Differenzzahl 64 zur Spindellänge, aber nur in ganz großen Zügen und nicht ohne Ausnahme: Stamm 27₂₁ fällt z. B. durch geringe Ährchenzahl bei mittlerer Spindellänge und Stamm 201₂₂ durch hohe Ährchenzahl bei niedriger Spindellänge auf.

In der Tabelle sind auch die tauben Ährchen in Prozenten der Ährchenzahl angegeben. Unter „taub“ sind hier nur die unfruchtbar gebliebenen Ährchen gerechnet; die durch Thrips zerstörten Gipfelährchen wurden nicht mitgezählt, weil sie vollkommen fehlten und die Fraßstellen an den Spindeln deutliche Anzeichen dafür gaben, daß ein fehlerfreies Erfassen aller beschädigten Ährchen nicht möglich war. Die Taubheit, die nach Schneiders (21) Angaben und v. Seelhorsts (21) Versuchsergebnissen auf Wassermangel während der Fruchtknotenentwicklung zurückzuführen ist, tritt bei den Sorten sehr verschieden stark auf: bei Stamm 27₂₁ beträgt sie nur 13%, um bei Stamm 197₂₂ bis zu 24,7% zu steigen. Die bei den Stämmen gefundenen Taubheitsprozente decken sich vollkommen mit den ohne Vorwissen dieser Zahlen gemachten Angaben ihres Züchters, der die Stämme jahrelang beobachtete. Es scheint also auch bei Gerste, wie v. Lochow es zuerst für Roggen bewies, die Taubheit ein stark erblicher Fehler zu sein. Die Differenzzahl 124 zum Taubheitsprozent deutet gegensinnige Beziehungen an. Mehrfach verhält sich aber die Taubheit auch proportional zur Höhe der Ährchenzahl..

Variabilität der Ährchenzahl. (Tabelle Vb.)

Die Variationskoeffizienten der Ährchenzahl sind niedrig und zeigen nur geringe Schwankungen, sie steigen von 7,71 V bei Stamm 48₂₂ bis zu 11,22 V bei Stamm 27₂₁, also um 45%. Sortenunterschiede in der Variabilität, die 1,31 V übersteigen, sind gesichert, jedoch sind sie nach den mittleren Schwankungskoeffizienten $S = 1,78$ 56%, also sehr viel weniger sicher festzustellen als bei V der Halmlänge, der Eigenschaft mit den besterkennbaren Verschiedenheiten. Die Mehrzahl der Sorten gehört zu den Gruppen „niedrig“ und „mittel“ und zwar zu gleichen Teilen, während nur drei Sorten hohe Variabilität aufweisen.

Beziehungen zwischen der Höhe von Mittelwert und
Tabelle Vb.

Variabilität der Aehrchenzahl.

Rang Nr.	N a m e	V	m(V) ±	M	m(M) ±	Gruppe
1	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	7,71	0,357	23,11	0,117	niedrig
2	Friedrichswerther Berg	7,89	0,386	23,14	0,126	"
3	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	8,10	0,383	23,05	0,125	"
4	Janetzkis späte	8,31	0,441	21,53	0,134	"
5	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	8,58	0,421	20,22	0,120	"
6	197 ₂₂	8,62	0,389	20,64	0,113	"
7	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Gold- thorpe)	8,72	0,423	22,42	0,134	"
8	Strengs	8,82	0,403	21,75	0,124	"
9	Egild	9,44	0,453	21,17	0,135	mittel
10	Eglfinger	9,45	0,470	21,50	0,143	"
11	Eckendorfer	9,51	0,434	21,43	0,132	"
12	Janetzkis frühe	9,56	0,474	21,83	0,146	"
13	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	9,57	0,459	21,44	0,139	"
14	201 ₂₂	9,63	0,459	21,97	0,143	"
15	Hanses Hübitzer	9,68	0,484	21,18	0,145	"
16	Dr. Grundmanns Wotan	9,76	0,446	22,13	0,139	"
17	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	10,82	0,528	20,66	0,154	hoch
18	Ackermanns Viktoria	11,16	0,520	19,49	0,143	"
19	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	11,22	0,474	20,76	0,139	"
			Dm (V) =1,77%		Dm (M) =0,63%	

Variationskoeffizient bestehen nicht, wir finden alle Kombinationen. Ebenso bestehen keine Beziehungen zu anderen V-Rangordnungen, auch nicht zur Kornzahl des längsten Halmes, dagegen fällt wie immer Stamm 48₂₂ durch seine besonders niedrige Variabilität auf.

Die Ährchenzahl als gering modifikable Eigenschaft gibt die erbliche Veranlagung zur mehr oder minder intensiven Ausbildung der Fruchtstände gut wieder und wird deshalb mit Recht als Auslesemoment in allen Zuchten gebraucht.

Ährchendichte D. des längsten Halmes. (Tabelle VIa.)

Die Ährchendichte D. zeigt in den Mittelwerten nur geringe Unterschiede, sie steigt von 28,08 bei Stamm 199₂₂ bis zu 32,51 bei Stamm 184₂₂ oder um 16% vom niedrigsten und 14% vom höchsten Werte. Der m (M) ist sehr gering, er beträgt durchschnittlich nur 0,28% des Mittelwerts. Sortenunterschiede über 0,35 sind noch sicher zu erfassen; daß sie in der Tabelle sehr klar hervortreten, beweist der mittlere Schwankungskoeffizient $S = 9,52$. Die Mehrzahl der Sorten weist „mittlere“ Ährchendichte auf, 6 sind als „locker“ anzusehen, während „dicht“ dagegen nur 3 Sorten sind.

Stamm 184₂₂ fällt durch besonders hohe Ährchendichte auf; das erklärt sich daraus, daß der Stamm mittlere Ährchenzahl mit sehr geringer Spindellänge verbindet. Die Standardabweichung ist bei Stamm 184₂₂ in allen dieser drei genannten Eigenschaften besonders hoch. Außer diesem einen Fall ist eine Beziehung zwischen Mittelwert und Standardabweichung nicht vorhanden, das wechselvolle Zusammentreten beider Größen und die dabei geringe Höhe der Standardabweichungen, die nur zwischen 0,77 und 2,08 liegen, beweisen, daß die Ährchendichte mehr von der erblichen Veranlagung abhängig ist als von äußeren Einflüssen.

Zu der Ährchenzahl bestehen nach der Differenzzahl 88 gar keine festen Beziehungen. Es treten in der Regel aber Ährchendichte, Ährchenzahl und Spindellänge in eine Wechselbeziehung, die sich zahlenmäßig in der Differenzzahl 132 für

Tabelle VIa.

Ährchen-

Rang-Nr.	N a m e	M	m (M) ±	σ ±	m (σ) ±	Gruppe	Spindel- länge		
							*) RO	**) DZ	cm M
1	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	28,08	0,078	1,130	0,055	locker	5	— 4	6,9
2	Ackermanns Viktoria	28,31	0,090	1,369	0,064	"	4	— 2	6,8
3	Eglfinger	28,81	0,082	1,172	0,058	"	19	— 16	7,6
4	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	28,81	0,090	1,506	0,064	"	12	— 8	7,2
5	Strengs	28,83	0,075	1,164	0,053	"	16	— 11	7,5
6	Janetzki's späte	29,48	0,108	1,431	0,076	"	13	— 7	7,3
7	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	29,62	0,089	1,288	0,063	mittel	6	1	6,8
8	41 ₂₂ (Hohenheim fr. Goldthorpe)	30,03	0,059	0,855	0,042	"	15	— 7	7,4
9	Eckendorfer	30,08	0,067	1,037	0,047	"	9	0	7,1
10	Egild	30,19	0,089	1,315	0,063	"	7	3	7,0
11	Dr. Grundmanns Wotan	30,28	0,064	0,996	0,045	"	14	— 3	7,3
12	Janetzki's frühe	30,32	0,095	1,356	0,067	"	11	1	7,2
13	48 ₂₂ (4zl. aus Schliephackes 2zl.)	30,35	0,050	0,771	0,036	"	18	— 5	7,6
14	Friedrichswerther Berg	30,52	0,095	1,374	0,067	"	17	— 3	7,5
15	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	30,73	0,064	1,009	0,045	"	2	13	6,7
16	201 ₂₂ "	30,73	0,073	1,090	0,052	"	8	8	7,2
17	194 ₂₂ "	31,04	0,083	1,243	0,059	dicht	10	7	7,2
18	Hanses Hübitzer	31,05	0,074	1,044	0,052	"	3	15	6,7
19	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	32,51	0,142	2,085	0,100	"	1	18	6,7
		Dm (M) = 0,28°					132		

*) RO = Rangordnung.

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen.

die Rangordnungen von Spindellänge und Ährchendichte ausdrückt, also in schwacher Gegensinnigkeit. Kurze Spindel und hohe Ährchenzahl geben naturgemäß auch keinen Raum für einen lockeren Stand der Ährchen. Daß Abweichungen von dieser Beziehung vorkommen, zeigen die beiden Stämme 27₂₁ und 184₂₂, doch ist diese Erscheinung bei Besprechung der Spindellänge schon genügend behandelt. Zur Halmgröße, Halmzahl und dem Pflanzengewicht ist mit den Differenzzahlen 128, 130 und 130 sehr lose gegensinnige Beziehung angedeutet; sie ist vielfach scharf durchbrochen. Ebenso ist Gegensinnigkeit auch zur Gesamtkornzahl nach der Differenzzahl 122 in einer Reihe von Fällen vorhanden. Daß hohe Ährchendichte die Kornentwicklung hemmen kann und damit das Tausendkorngewicht drücken, ist verständlich (Differenzzahl 122). Und doch hat Stamm 184₂₂ mit seiner extrem dichten Ähre leidlich hohes Tausendkorngewicht.

Dichte D.

Ährchen- zahl		Halmlänge			Anzahl der Halme			Tausend- korngewicht			Gewicht der ganz. Pflanze			Gesamt- kornzahl		
DZ	M	RO	DZ	cm M	RO	DZ	M	RO	DZ	g M	RO	DZ	g M	RO	DZ	M
— 1	20,22	14	—13	132,88	8	— 7	5,75	18	—17	46,78	8	— 7	22,23	2	— 1	236,35
1	21,43	15	—13	133,06	10	— 8	6,27	7	— 5	40,96	7	— 5	21,65	5	— 3	245,13
— 7	21,50	19	—16	142,77	12	— 9	6,30	1	— 2	38,98	13	—10	23,18	17	—14	288,47
— 1	20,76	1	— 3	118,04	17	—13	6,74	10	— 6	41,93	18	—14	24,66	15	—11	279,43
— 7	21,75	18	—13	134,57	9	— 4	6,01	11	— 6	42,06	16	—11	23,95	13	— 8	277,42
— 5	21,53	3	— 3	124,89	3	— 3	5,53	17	—11	45,37	15	— 9	23,77	1	— 5	233,50
3	23,11	6	— 1	126,63	13	— 6	6,38	8	— 1	41,63	3	— 4	20,94	11	— 4	258,38
— 8	22,42	17	— 9	134,48	4	— 4	5,63	16	— 8	44,53	10	— 2	22,52	6	— 2	249,86
1	21,43	7	— 2	127,93	18	— 9	6,77	4	— 5	39,64	9	— 0	22,26	16	— 7	286,63
4	21,17	4	— 6	125,65	19	— 9	7,36	3	— 7	39,08	14	— 4	23,26	18	— 8	294,50
— 4	22,13	11	— 0	129,62	6	— 5	5,70	12	— 1	42,20	6	— 5	21,65	0	— 2	256,25
— 1	21,83	9	— 3	129,01	5	— 7	5,63	9	— 3	41,75	1	—11	19,75	4	— 8	242,45
— 5	23,11	13	— 0	130,11	1	—12	5,46	15	— 2	44,51	11	— 2	22,90	8	— 5	256,01
— 5	23,14	8	— 6	127,95	11	— 3	6,29	5	— 9	40,80	17	— 3	24,18	19	— 5	298,37
12	20,64	2	—13	121,86	14	— 1	6,41	19	— 4	47,31	12	— 3	23,17	10	— 5	258,12
2	21,97	12	— 4	130,03	2	—14	5,48	14	— 2	43,83	5	—11	21,59	3	—13	240,05
0	23,05	10	— 7	129,21	7	—10	5,71	6	—11	40,90	2	—15	20,49	7	—10	250,58
11	21,18	5	—13	126,23	16	— 2	6,70	2	—16	39,03	4	—14	21,38	12	— 6	269,95
10	21,44	16	— 3	134,38	15	— 4	6,50	13	— 6	43,60	19	— 0	25,31	14	— 5	278,34
88			128			130			122			130			122	

Die Ährchendichte ist, kurz gesagt, von anderen Eigenschaften verhältnismäßig wenig abhängig, sie bringt ihren erblichen Charakter selbst im stärkeren Maße zum Ausdruck.

Variabilität der Ährchendichte D. (Tabelle VIb).

Die Variationskoeffizienten der Ährchendichte sind ausgesprochen niedrig; sie schwanken zwischen 2,54V bei Stamm 48₂₂ und 6,42V bei Stamm 184₂₂, der höchste Variationskoeffizient ist also 1½ mal so groß wie der geringste. Bei dieser hohen Schwankung und dem geringen doppelten mittleren Fehler der Differenz 0,61 lassen sich Sortenunterschiede in der Variabilität leicht feststellen; der mittlere Schwankungskoeffizient S=3,58 gibt dem auch Ausdruck. 10 Sorten zeigen mittlere Variabilität, 7 Sorten gehören der Gruppe „niedrig“ an, während 2 Sorten durch besonders

hohe Variationskoeffizienten auffallen. Es sind dies die Geschwisterstämme 27₂₁ und 184₂₂. Der letztere fiel ja, wie schon eingangs erwähnt, durch seine Ährchendichte auf, dagegen steht Stamm 27₂₁ bei hoher Variabilität unter den lockersten Sorten.

Eine feste Beziehung zwischen Mittelwert und Variationskoeffizienten besteht auch bei der Ährchendichte D. nicht, es findet sich ein sehr wechselvolles Verhältnis beider. Die Beziehungen zu den V-Rangordnungen anderer Eigenschaften gehen auch hier wieder nicht darüber hinaus, daß bestimmte Sorten besonders hohe bzw. geringe Schwankungen zeigen.

Als Auslesemoment ist die Ährchendichte der Wintergerste mit ihrer geringen Variabilität besonders gut zu verwenden. Besonders dichte Ähren werden den dachziegelartig

Tabelle VIb.
Variabilität der Aehrchendichte D.

Rang Nr.	N a m e	V	m (V) ±	M	m (M) ±	Gruppe
1	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	2,54	0,118	30,35	0,050	niedrig
2	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	2,85	0,138	30,03	0,059	"
3	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	3,28	0,148	30,73	0,064	"
4	Dr. Grundmanns Wotan	3,29	0,150	30,28	0,064	"
5	Hanses Hübitzer	3,36	0,168	31,05	0,074	"
6	Eckendorfer	3,45	0,157	30,08	0,067	"
7	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	3,55	0,169	30,73	0,073	"
8	194 ₂₂ "	4,00	0,189	31,04	0,083	mittel
9	199 ₂₂ "	4,02	0,197	28,08	0,078	"
10	Strengs	4,04	0,184	28,83	0,075	"
11	Eglfinger	4,06	0,202	28,81	0,082	"
12	Egild	4,35	0,209	30,19	0,089	"
13	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	4,35	0,212	29,62	0,089	"
14	Janetzkis frühe	4,47	0,222	30,32	0,095	"
15	Friedrichswerther Berg	4,50	0,220	30,52	0,095	"
16	Ackermanns Viktoria	4,84	0,226	28,31	0,090	"
17	Janetzkis späte	4,85	0,258	29,48	0,108	"
18	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	5,23	0,221	28,81	0,090	hoch
19	184 ₂₂ "	6,42	0,308	32,51	0,142	"
		Dm (V) =4,77%		Dm (M) =0,28%		

übereinandersitzenden Seitenkörnern nur wenig Raum zu vollkommenerer Entwicklung geben, das Tausendkorngewicht sinkt, zudem werden solche dicht und sperrig abstehenden Körner bei gegenseitiger Reibung der Ähren durch den Wind leichter ausfallen als Körner nur mitteldichter Ähren, die an der Spindel, sich gegenseitig schützend, anliegen. Lockere Ähren wird man wegzuzüchten haben, weil sie leichter brechen.

Kornzahl des längsten Halmes.

(Tabelle VII a).

Die Kornzahl des längsten Halmes zeigt im Vergleich mit anderen Eigenschaften mittlere Schwankungen der Sortenmittel. Diese steigen von 45,73 Körnern bei Ackermanns Viktoria bis zu 56,18 Körnern bei Stamm 48₂₂ gleichmäßig an, d. h. um eine Spanne, die 23% der niedrigsten und 19% der höchsten Kornzahl beträgt. Der $m(M)$ ist durchschnittlich gleich 0,88% des Mittelwerts und gestattet noch die sichere Festlegung von Sortendifferenzen über 1,6 Körner hinaus. Nach dem mittleren Schwankungskoeffizienten $S=5,03$ sind Sortenunterschiede noch genügend zu erkennen. Die Hälfte der Sorten hat „mittlere“ Kornzahl, während die Gruppen „niedrig“ nur mit 4 und „hoch“ mit 6 Sorten vertreten sind.

Es ist auffällig, daß die Tabelle der Kornzahl verhältnismäßig soviel weitere Ausdehnung hat als die der dazugehörigen Ährchenzahl. In der hohen Standardabweichung liegt der Grund nicht, wir finden sie bald bei hohem, bald bei geringem Mittelwert, es liegt also kein Zusammenhang beider Größen vor. Vielmehr ist die Kornzahl des Hauptalmes wieder von zwei variablen Größen abhängig, der Ährchenzahl und besonders dem Taubheitsprozentsatz der einzelnen Sorten.

Mit der Ährchenzahl an sich herrscht nach der Differenzzahl 50 Gleichsinnigkeit der Beziehungen, hohe Ährchenzahl bringt auch höhere Kornzahl mit sich. Zu den Taubheitsprozenten dagegen besteht Gegensinnigkeit (Differenzzahl 154). Die Zahl der tauben Ährchen korrigiert also die Kornzahl gegenüber der Ährchenzahl. Es belegen hier z. B. die Stämme

Tabelle VIIa.

Kornzahl des

Rang-Nr.	N a m e	M	m (M) ±	σ ±	m (σ) ±	Grup- pe	Spindel- länge		
							*) RO	**) DZ	M cm
1	Ackermanns Viktoria	45,73	0,373	5,651	0,263	niedrig	4	—3	6,88
2	Hanses Hübitzer	47,15	0,505	7,138	0,357	"	3	—1	6,82
3	Egild	48,40	0,436	6,433	0,308	"	7	—4	7,03
4	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	48,56	0,377	5,918	0,267	"	2	2	6,71
5	Janetzki's frühe	49,29	0,473	6,733	0,334	mittel	11	—5	6,96
6	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	50,12	0,392	5,647	0,277	"	5	1	6,96
7	Eckendorfer	50,36	0,393	6,091	0,278	"	9	—2	7,19
8	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	50,78	0,533	7,720	0,377	"	6	2	6,99
9	27 ₂₁ "	51,92	0,489	8,185	0,346	"	12	—3	7,21
10	Janetzki's späte	51,99	0,481	6,401	0,340	"	13	—3	7,31
11	Strengs	52,33	0,525	7,792	0,371	"	8	3	7,14
12	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	52,38	0,410	6,346	0,290	"	16	—4	7,54
13	20 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	52,39	0,447	6,581	0,316	"	1	12	6,62
14	Dr. Grundmanns Wotan	53,09	0,437	6,768	0,309	hoch	14	0	7,32
15	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	53,60	0,424	6,343	0,300	"	10	5	7,21
16	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	54,46	0,513	7,466	0,363	"	15	1	7,46
17	Eglfinger	55,13	0,478	6,799	0,338	"	19	—2	7,63
18	Friedrichswerther Berg	55,43	0,618	8,936	0,437	"	17	1	7,57
19	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliep- hackes 2 zl.)	56,18	0,415	6,331	0,293	"	18	1	7,62
			Dm (M) = 0,88 ⁹					56	

*) RO = Rangordnung

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen

27₂₁ und 181₂₂ einen viel besseren Platz als bei der Ährchenzahl, weil sie weniger Anlage zur Taubheit haben. Daß mit der Spindellänge schwache Gleichsinnigkeit der Beziehungen herrscht (Differenzzahl 56), ist verständlich, weil Spindellänge und Ährchenzahl in demselben Verhältnis zueinander stehen. Zu der Ährchendichte bestehen keine festen Beziehungen. Eglfinger mit sehr lockerer Ähre weist doch hohe Kornzahl auf, sie hat bei mittlerer Ährchenzahl nur geringe Taubheitsanlage. Denselben Einfluß, den die Halmzahl auf Spindellänge und Ährchenzahl des Haupthalmes hat, übt sie

längsten Halmes.

Aehrchen- zahl			Korngewicht d. längst. Halmes			Anzahl der Halme			Gesamtkorn- zahl			Tauben Aehrchen ‰											
RO	DZ	M	RO	DZ	$\frac{g}{M}$	RO	DZ	M	RO	DZ	M	RO	DZ	M									
1	0	19,49	4	—	3	2,04	10	—	9	6,27	5	—	4	245,13	11	—	10	19,7					
7	—5	21,18	1	1	1,88	16	—14	6,70	12	—10	269,95	18	—16	24,6									
6	—3	21,17	2	1	1,90	19	—16	7,36	18	—15	294,50	17	—14	23,0									
3	1	20,64	7	—	3	2,25	14	—10	6,41	10	—	6	258,12	19	—15	24,7							
13	—8	20,22	3	2	2,03	5	0	5,63	4	1	242,45	16	—11	22,0									
2	4	20,22	16	—10	2,33	8	—	2	5,75	2	4	236,35	6	0	18,6								
8	—1	21,43	5	2	2,05	18	—11	6,77	16	—	9	286,63	15	—	8	22,0							
4	4	20,66	8	0	2,25	13	—	5	6,38	11	—	3	258,38	2	6	15,6							
5	4	20,76	6	3	2,23	17	—	8	6,74	15	—	6	279,43	1	8	13,0							
11	—1	21,53	17	—	7	2,45	3	7	5,53	1	—	9	233,50	5	5	17,1							
14	—3	21,97	11	0	2,28	2	9	5,48	3	8	240,05	14	—	3	20,2								
12	0	21,75	9	3	2,26	9	3	6,01	13	—	1	277,42	8	4	19,0								
9	4	21,44	15	—	2	2,32	15	—	2	6,50	14	—	1	278,34	7	6	19,0						
15	—1	22,13	13	1	2,29	6	8	5,70	9	5	256,25	13	1	20,1									
17	—2	23,05	12	3	2,28	7	8	5,71	7	8	250,58	10	5	19,7									
16	0	22,42	18	—	2	2,46	4	12	5,63	6	10	249,86	9	7	19,1								
10	7	21,50	10	7	2,26	12	5	6,30	17	0	288,47	4	13	16,6									
19	—1	23,14	14	4	2,30	11	7	6,29	19	—	1	298,37	12	6	19,7								
18	1	23,11	19	0	2,52	1	18	5,46	8	11	256,01	3	16	16,5									
50			54			154			112			154											

auch auf seine Kornzahl aus, starke Bestockung drückt die Kornzahl des Einzelhalmes herab (Differenzzahl 154). Hier fallen Eglfinger und Friedrichswerther Berg mit höherem Bestockungsgrad, aber doch hoher Kornzahl des Haupthalmes auf, bei diesem verursacht durch besonders hohe Ährchenzahl, dort durch geringere Taubheitsanlage bei mittlerer Ährchenzahl. Zum Kornprozent herrschen nach der Differenzzahl 134 schwach gegensinnige Beziehungen, die jedoch in mehreren Fällen auch aufgehoben sind, weil die Bestimmungsfaktoren des Kornprozents teilweise ganz entgegengesetzt wirken.

Variabilität der Kornzahl des längsten Halmes.
(Tabelle VII b).

Die Variationskoeffizienten der Kornzahl des Hauptalmes liegen in mittlerer Höhe, sie zeigen geringe Schwankungen. Die Variabilität steigt von 11,27 V bei Stamm 48₂₂ um 43% bis zu 16,12 V bei Friedrichswerther Berg. Sortenunterschiede sind auf Grund des doppelten mittleren Fehlers der Differenz nur über 2,0 V gesichert, nach dem mittleren Schwankungskoeffizienten $S = 1,96$ sind sie nur halb so gut zu erkennen als bei V der Halmhöhe. Die Mehrzahl der Sorten gehört der „niedrigen“ Gruppe an, der „mittleren“ nur 3, während 5 Sorten hohe Variabilität zeigen.

Die höhere Variabilität ist nicht allein auf erbliche Eigentümlichkeit zurückzuführen, sondern auch auf den starken

Tabelle VIIb.

Variabilität der Kornzahl des längsten Halmes.

Rang Nr.	N a m e	V	m (V) ±	M	m (M) ±	Gruppe
1	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	11,27	0,522	56,18	0,415	niedrig
2	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	11,27	0,552	50,12	0,392	„
3	194 ₂₂ „	11,83	0,559	53,60	0,424	„
4	Eckendorfer	12,10	0,552	50,36	0,393	„
5	Strengs	12,12	0,553	52,38	0,410	„
6	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	12,19	0,549	48,56	0,377	„
7	Janetzki's späte	12,31	0,654	51,99	0,481	„
8	Eglfinger	12,33	0,614	55,13	0,478	„
9	Ackermanns Viktoria	12,36	0,576	45,73	0,373	„
10	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	12,56	0,603	52,39	0,447	„
11	Dr. Grundmanns Wotan	12,75	0,582	53,09	0,437	„
12	Egild	13,29	0,637	48,40	0,436	mittel
13	Janetzki's frühe	13,67	0,680	49,29	0,473	„
14	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Gold- thorpe)	13,71	0,666	54,46	0,513	„
15	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	14,89	0,710	52,33	0,525	hoch
16	Hanses Hübitzer	15,14	0,757	47,15	0,505	„
17	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	15,20	0,742	50,78	0,533	„
18	27 ₂₁ „	15,77	0,666	51,92	0,489	„
19	Friedrichswerther Berg	16,12	0,789	55,43	0,618	„
			Dm (V) = 4,77 %		Dm (M) = 0,68 %	

Einfluß der Faktoren, die die Kornzahl des Haupthalmes mitbestimmen, Ährchenzahl, Taubheitsprozent und Bestockung, und die vorher jede für sich schon der Variation unterworfen sind.

Zwischen den Variationskoeffizienten und ihren Mittelwerten besteht gar keine Beziehung, es fällt nur wieder Stamm 48₂₂ durch besonders geringe Variabilität bei höchster Kornzahl auf, während Hübitzer mit dem geringsten Mittelwert zu den höchstvariablen Sorten gehört.

Der Vergleich mit den V-Rangordnungen anderer Eigenschaften zeigt nur schwache Berührungspunkte innerhalb der Gruppen, was für die Ährchenzahl als die nächststehende Eigenschaft verwunderlich ist. Besonders auffällig ist hier, daß Friedrichswerther Berg, die bei der Ährchenzahl fast den kleinsten Variationskoeffizienten hat, bei der Kornzahl mit ihm ziemlich an höchster Stelle steht.

Der Wert der Kornzahl des längsten Halmes als Auslesemoment ist beschränkt, einmal, weil sie von zu vielen anderen Faktoren bestimmt wird und dadurch nur in geringem Maße ihren eigenen Erbwert wiedergeben kann, dann aber auch wegen ihrer ziemlich hohen Variabilität.

Korngewicht des längsten Halmes. (Tabelle VIII a).

Das Korngewicht des Haupthalmes weist bei den untersuchten Wintergerstensorten starke Schwankungen auf: es steigt von 1,88 g bei Hübitzer bis zu 2,52 g bei Stamm 48₂₂, also um 0,64 g oder 34% des niedrigsten und 25% des höchsten Halmertrages. Der mittlere Fehler beträgt im Durchschnitt 1,14%; Sortenunterschiede, die nicht feiner sind als 0,08 g, können noch sicher erfaßt werden; auf Grund des mittleren Schwankungskoeffizienten $S = 5,34$ treten sie auch gut hervor. In ganz allmählicher Steigerung ordnen sich die Sorten zu gleichen Teilen in die drei Gruppen ein.

Die Rangordnung beim Halmertrag verläuft fast gleich der der Reifezeit, die frühen Sorten haben geringeren Halm-

Tabelle VIIIa.

Korngewicht des

Rang-Nr.	N a m e	M g	m (M) ±	σ ±	m(σ) ±	Gruppe	Kornzahl d. längst. Halms		
							*) RO	**) DZ	M
1	Hanses Hübitzer	1,88	0,026	0,374	0,019	niedrig	2	—1	47
2	Egild	1,90	0,025	0,372	0,018	"	3	—1	48
3	Janetzkis frühe	2,03	0,024	0,339	0,017	"	5	—2	49
4	Ackermanns Viktoria	2,04	0,024	0,369	0,017	"	1	3	48
5	Eckendorfer	2,05	0,022	0,343	0,016	"	7	—2	50
6	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	2,23	0,027	0,450	0,019	mittel	9	—3	51
7	197 ₂₂ "	2,25	0,023	0,360	0,016	"	4	3	48
8	181 ₂₂ "	2,25	0,027	0,385	0,019	"	8	0	50
9	Strengs	2,26	0,024	0,372	0,017	"	12	—3	52
10	Eglfinger	2,26	0,028	0,402	0,020	"	17	—7	53
11	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	2,28	0,026	0,389	0,019	"	11	0	52
12	194 ₂₂ "	2,28	0,032	0,475	0,022	"	15	—3	53
13	Dr. Grundmanns Wotan	2,29	0,021	0,333	0,015	"	14	—1	53
14	Friedrichswerther Berg	2,30	0,026	0,380	0,019	hoch	18	—4	55
15	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	2,32	0,027	0,395	0,019	"	13	2	51
16	199 ₂₂ "	2,33	0,021	0,302	0,015	"	6	10	50
17	Janetzkis späte	2,45	0,029	0,381	0,020	"	10	7	51
18	41 ₂₂ (Hohenheim.fr.Goldthorpe)	2,46	0,026	0,375	0,018	"	16	2	51
19	48 ₂₂ (4zl. aus Schliephackes 2zl.)	2,52	0,022	0,339	0,016	"	19	0	51
		Dm (M) =1,14%						54	

*) RO = Rangordnung.

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen.

ertrag als die späten. Diese Beziehung findet bei der Variabilität in großen Zügen ihre Umkehrung. Der Halmertrag ist gleich der Kornzahl an eine Reihe von Komponenten gebunden, deren hauptsächlichste die Kornzahl des Haupthalms und das Tausendkorngewicht sind. Die Differenzzahl 54 mit der Kornzahl zeigt gleichsinnige Beziehungen an, doch fällt Stamm 199₂₂ durch geringe Kornzahl bei hohem Halmertrag auf: Die Erklärung liegt im Tausendkorngewicht, durch dessen Höhe Stamm 199₂₂ sich auszeichnet. Stamm 27₂₁ zeigt die entgegengesetzte Erscheinung, mäßigen Halmertrag trotz mittlerer Kornzahl, aber mit geringem Tausendkorngewicht. Nach diesen Erörterungen ist es klar, daß im allgemeinen das Tausendkorngewicht proportional dem Halmertrag sein wird (Differenzzahl 68); Abweichungen davon lassen sich leicht durch veränderte Kornzahl erklären. Zur Spindellänge und Ährchenzahl finden sich keine festen Be-

ngsten Halmes.

Zahl Halmes		Gesamt- kornzahl			Gesamt- korngewicht			Tausend- korngewicht			Gewicht der ganz. Pflanze			Gelb- reife am	Variations- koeffizient	
Z	M	RO	DZ	M	RO	DZ	g M	RO	DZ	g M	RO	DZ	g M		RO	V
15,6,70	12	—	11	269,95	5	—	4	10,50	2	—	1	39,03	4	—	3	21,38
17,7,36	18	—	16	294,50	15	—	13	11,45	3	—	1	39,08	14	—	12	23,26
2,5,63	4	—	1	242,45	1	—	2	10,09	9	—	6	41,75	1	—	2	19,75
6,6,27	5	—	1	245,13	2	—	2	10,17	7	—	3	40,96	7	—	3	21,65
13,6,77	16	—	11	286,63	12	—	7	11,30	4	—	1	39,64	9	—	4	22,26
11,6,74	15	—	9	279,43	16	—	10	11,62	10	—	4	41,93	18	—	12	24,66
7,6,41	10	—	3	258,12	19	—	12	12,18	19	—	12	47,31	12	—	5	23,17
5,6,38	11	—	3	258,38	7	—	1	10,63	8	—	0	41,63	3	—	5	20,94
0,6,01	13	—	4	277,42	13	—	4	11,38	11	—	2	42,06	16	—	7	23,95
2,6,30	17	—	7	288,47	11	—	1	11,27	1	—	9	38,98	13	—	3	23,18
9,5,48	3	—	8	240,05	4	—	7	10,43	14	—	3	43,83	5	—	6	21,59
5,5,71	7	—	5	250,58	3	—	9	10,18	6	—	6	40,90	2	—	10	20,49
7,5,70	9	—	4	256,25	8	—	5	10,65	12	—	1	42,28	6	—	7	21,65
3,6,29	19	—	5	298,37	17	—	3	12,10	5	—	9	40,80	17	—	3	24,18
0,6,50	14	—	1	278,34	18	—	3	12,15	13	—	2	43,60	19	—	4	25,31
8,5,75	2	—	14	236,35	9	—	7	10,92	18	—	2	46,78	8	—	8	22,23
4,5,53	1	—	16	233,50	6	—	11	10,62	17	—	0	45,37	15	—	2	23,77
4,5,63	6	—	12	249,86	10	—	8	11,14	16	—	2	44,53	10	—	8	22,52
8,5,46	8	—	11	256,01	14	—	5	11,41	15	—	4	44,51	11	—	8	22,90
156			142				114				68		112			

ziehungen, jedoch herrscht zur Ährchendichte schwache Gegensinnigkeit: Lockere Ährenbildung bringt bessere Kornausbildung mit sich und gleicht so die mit ihr meist verbundene geringere Kornzahl wieder aus, wie dies ja der vorerwähnte Stamm 199₂₂ zeigte.

Wesentlich für den Halmertrag ist die Anzahl der Halme, genau wie sie es bei der Kornzahl war. Deutlich gegensinnige Beziehungen sind auch hier vorhanden, wie die Differenzzahl 156 besagt. In demselben Zusammenhang ist auch die Gesamtkornzahl zu erwähnen, die die Ausbildung des Einzelhalmes beeinträchtigt (Differenzzahl 142). Die schwache Gegensinnigkeit zum Gesamtkorngewicht (Differenzzahl 114) und zum Gewicht der ganzen Pflanze (Differenzzahl 112) deutet an, daß der Halmertrag auch bei ihnen mitbestimmend wirken kann; bei Stamm 48₂₂ sichert z. B. der hohe Halmertrag den guten Pflanzenertrag. Diese Be-

ziehung ist jedoch sehr unsicher, wie die Differenzzahl 126 mit dem Kornprozent zeigt, bei Janetzkis später W. G. findet kein Ausgleich des geringen Gesamtkorngewichts durch besseren Halmertrag statt, das Kornprozent bleibt gering.

Variabilität des Korngewichts des längsten Halmes.

(Tabelle VIII b).

Die Variationskoeffizienten des Halmertrags sind gegenüber den niedrigen Mittelwerten verhältnismäßig hoch und zeigen noch größere Schwankungen als diese. Sie steigen von 13,0V bei Stamm 199₂₂ bis 20,8V bei Stamm 194₂₂, also um 60%. Ihre mittleren Fehler sichern noch Sortenunterschiede, die über 2,58V liegen. Der mittlere Schwankungs-

Tabelle VIIIb.

Variabilität des Korngewichts des längsten Halmes.

Rang Nr.	N a m e	V	m (V) ±	M	m (M) ±	Gruppe
1	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	13,00	0,637	2,33	0,021	niedrig
2	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	13,41	0,621	2,52	0,022	"
3	Dr. Grundmanns Wotan	14,52	0,663	2,29	0,021	"
4	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	15,27	0,742	2,46	0,026	"
5	Janetzkis späte	15,56	0,827	2,45	0,029	"
6	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	16,01	0,722	2,25	0,023	mittel
7	Strengs	16,48	0,752	2,46	0,026	"
8	Friedrichswerther Berg	16,49	0,806	2,30	0,026	"
9	Janetzkis frühe	16,70	0,829	2,03	0,024	"
10	Eckendorfer	16,71	0,763	2,05	0,022	"
11	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	17,01	0,816	2,32	0,027	"
12	201 ₂₂ "	17,05	0,813	2,28	0,026	"
13	181 ₂₂ "	17,11	0,835	2,25	0,027	"
14	Eglfinger	17,76	0,884	2,26	0,028	"
15	Ackermanns Viktoria	18,08	0,843	2,04	0,024	"
16	Egild	19,58	0,938	1,90	0,025	hoch
17	Hanses Hübitzer	19,86	0,993	1,88	0,026	"
18	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	20,16	0,852	2,23	0,027	"
19	194 ₂₂ "	20,80	0,983	2,28	0,032	"
			Dm (V) = 4 77°		Dm (M) = 1,14°	

koeffizient $S=2,0$ deutet an, daß sich solche nur halb so leicht finden lassen werden als bei V der Halmlänge. Mehr als die Hälfte der Sorten zeigt mittlere Variabilität, nur 5 gehören der Gruppe „niedrig“ an und 4 zu „hoch“.

Mit hoher Variabilität fallen hier wieder die Sorten 27₂₁, 181₂₂, Hübitzer und 194₂₂ auf, die wir schon oft mit der höchsten Variabilität behaftet gefunden hatten. Sie stehen an dieser Stelle auch bei der Kornzahl des Haupthalmes bis auf Stamm 194₂₂, der in dieser Eigenschaft wenig variiert. Seine Variabilität beim Tausendkorngewicht schickt ihn aber in diese Gruppe. Im übrigen bestehen sonst Beziehungen zu den V -Rangordnungen der Kornzahl und des Tausendkorngewichts nur im weiteren Sinne; obwohl sich gewisse Berührungspunkte finden, gibt es Sorten, die stark abweichen.

Durch die Höhe der Variationskoeffizienten verliert der Halmertrag als Auslesemerkmal an Wert. Und doch wird er vielfach in der Praxis angewandt, weil er einen besseren Maßstab für die Qualität des Zuchtproduktes gibt als der gesamte Pflanzenertrag, der leicht durch nachgewachsene Halme in seinem qualitativen Charakter beeinträchtigt wird, dann aber auch, weil er bis zu einem gewissen Grade die Grundlage und Sicherheit des Pflanzenertrages bedeutet. Pflanzenertrag, Bestockung und Tausendkorngewicht dürfen bei seiner Heranziehung zur Sortencharakteristik als Vergleichsfaktoren nicht fehlen.

Gesamtkornzahl. (Tabelle IX a).

Höhere Schwankungen zwischen den extremen Sorten als die Kornzahl des längsten Halmes weist die Gesamtkornzahl auf. An niedrigster Stelle steht Janetzki's späte W. G. mit 233 Körnern, an höchster Friedrichswerther Berg mit 298. Diese weite Spanne beträgt 28% der geringsten und 22% der höchsten Kornzahl. Der m (M) beträgt durchschnittlich 2,14%; nur höhere Sortenunterschiede als 18 Körner sind als gesichert anzusehen, sie finden sich nach dem mittleren Schwankungskoeffizienten $S = 3,10$ im Vergleich zu

Tabelle IXa.

Gesamtkornzahl.

Rang-Nr.	N a m e	M	m (M) ±	σ	m (σ) ±	Grupp- pe	Gesamt- korngewicht (*) **)			Anzahl der Halme			Tausend- korngewicht			Halmlänge			Korngew. d. längst. Halm.		
							RO	DZ	M	RO	DZ	M	RO	DZ	M	RO	DZ	M	RO	DZ	M
1	Janetzkiis späte	233,50	6,474	86,136	4,578	niedrig	6	—5	10,62	3	—2	5,53	17	—16	45,37	3	—	2124,89	17	—	16 2,45
2	199 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	236,35	4,514	65,255	3,199	"	9	—7	10,92	8	—6	5,75	18	—16	46,78	14	—	12132,88	16	—	14 2,33
3	201 ²² "	240,05	4,244	62,955	3,001	"	4	—1	10,43	2	—1	5,48	14	—11	43,83	12	—	9230,03	11	—	8 2,28
4	Janetzkiis frühe	242,45	5,261	74,957	3,720	"	1	3	10,09	5	—1	5,63	9	—	541,75	9	—	5124,89	3	—	1 2,03
5	Ackermanns Viktoria	245,13	6,530	99,029	4,617	"	2	3	10,17	10	—5	6,27	7	—	240,96	15	—	10133,06	4	—	1 2,04
6	41 ²² (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	249,86	4,781	69,608	3,380	"	10	—4	11,14	4	—	5,63	16	—10	44,53	17	—	11134,48	18	—	12 2,46
7	194 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	250,58	6,547	97,982	4,609	"	3	4	10,18	7	—0	5,71	6	—	140,90	10	—	3129,21	12	—	5 2,28
8	48 ²² (4 zl. aus Schliep- hackes 2 zl.)	256,01	4,169	63,648	2,948	mittel	14	—6	11,41	1	—	5,46	15	—	744,51	13	—	5130,11	19	—	11 2,52
9	Dr. Grundmanns Wotan	256,25	5,011	77,638	3,544	"	8	1	10,65	6	—3	5,70	12	—	342,28	11	—	2121,86	13	—	4 2,29
10	197 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	258,12	4,659	73,065	3,294	"	19	—9	12,18	14	—4	6,41	19	—	947,31	2	—	8121,86	7	—	3 2,25
11	181 ²² "	258,38	6,265	90,783	4,430	"	7	4	10,63	13	—2	6,38	8	—	341,63	6	—	5126,63	8	—	3 2,25
12	Hanses Hübtlitzer	269,95	6,251	88,397	4,420	"	5	7	10,50	16	—4	6,70	2	—	1039,03	5	—	7126,23	1	—	11 1,88
13	Strengs	277,42	5,803	89,907	4,104	hoch	13	—0	11,38	9	—4	6,01	11	—	242,06	18	—	5134,57	9	—	4 2,26
14	184 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	278,34	6,642	97,839	4,696	"	18	—4	12,15	15	—1	6,50	13	—	143,60	16	—	2134,38	15	—	1 2,32
15	27 ²¹ "	279,43	7,074	118,365	5,002	"	16	—1	11,62	17	—2	6,74	10	—	541,93	1	—	14118,04	6	—	9 2,23
16	Eckendorfer	286,63	5,168	80,059	3,654	"	12	4	11,30	18	—2	6,77	4	—	1239,64	7	—	9127,93	5	—	11 2,05
17	Eglinger	288,47	6,060	86,132	4,285	"	11	6	11,27	12	—5	6,30	1	—	1638,98	19	—	2142,77	10	—	7 2,26
18	Egild	294,50	5,612	82,856	3,968	"	15	3	11,45	19	—1	7,36	3	—	1539,08	4	—	14125,65	2	—	16 1,90
19	Friedrichswerther Berg	298,37	6,008	86,855	4,248	"	17	2	12,10	11	—8	6,29	5	—	1440,80	8	—	11127,95	14	—	5 2,30
								74			60		158			136				142	

*) RO = Rangordnung

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen

den anderen Eigenschaften aber nur in geringer Zahl vor. Bei der Gruppenteilung fallen 7 Sorten unter „hohe“, 7 unter „niedrige“ und 5 Sorten unter „mittlere“ Kornzahl.

Die Standardabweichungen sind bei der Gesamtkornzahl am höchsten, unterliegen aber auch sehr großen Schwankungen innerhalb der Sorten; sie liegen zwischen 62 und 118. Eine feste Beziehung, daß etwa zu dem höheren M auch höheres σ gehöre, fehlt. Da Verschiedenheiten der Lebensbedingungen während der Vegetation nicht vorlagen, auch die Bestockungsgrade nicht modifiziert waren, kann man aus diesen hohen Verschiedenheiten schließen, daß sie den Sortencharakter klar wiedergeben.

Die Kornzahl steht in engem Zusammenhang mit der Bestockung. Die Differenzzahl beider, 60, drückt dies Verhältnis auch aus. Abweichend davon hat Stamm 48₂₂ trotz geringer Halmzahl mittlere Kornzahl: Die extrem hohe Kornzahl der Einzelhalme schafft hier den Ausgleich. Sonst besteht aber zwischen der Kornzahl des Haupthalmes und der Gesamtkornzahl keinerlei konstante Abhängigkeit, beide treten in buntem Wechsel nebeneinander. Im Grunde genommen sind ja auch die Faktoren, die die Gesamtkornzahl bestimmen, weit andere als bei der Kornzahl des längsten Halmes; hier sind es Ährchenzahl und Taubheitsprozensatz, während bei jener diese beiden Komponenten von der Bestockung im Einfluß noch überboten werden.

Zur Ährchenzahl liegt nach der Differenzzahl 132 sogar schwache Gegensinnigkeit der Beziehungen vor, sie wird aber, wie schon eben angedeutet, noch durch die prozentuale Taubheit der Sorten abgeschwächt und ausgeglichen, sodaß das Verhältnis der Ährchenzahl des Haupthalmes dem seiner Kornzahl zur Gesamtkornzahl gleicht.

Die Beziehungen von Gesamtkornzahl zu Gesamtkorngewicht ließen eigentlich eine engere Parallelität erwarten, als die Differenzzahl 74 es andeutet. Hier wirkt aber, wie schon beim Halmertrag, das Tausendkorngewicht als Nebenfaktor mit und drückt den Pflanzenertrag wie z. B. bei Hübitzer und Eglfinger herunter.

Zum Tausendkorngewicht herrscht nach der Differenzzahl 158 Gegensinnigkeit, desgleichen in schwächerem Grade auch zum Halmertrag, wie dort bereits erwähnt war. Die sich in der Differenzzahl 136 ausdrückende schwache Gegensinnigkeit von Gesamtkornzahl zur Halmlänge hat wohl nicht mehr als den Wert des Zufalls.

Variabilität der Gesamtkornzahl.
(Tabelle IX b.)

Die Variationskoeffizienten der Gesamtkornzahl gehören zu den höchsten überhaupt und unterliegen mittelgroßen Schwankungen der Extreme. Sie bewegen sich zwischen 24,86 V bei Stamm 48₂₂ und 42,36 V bei Stamm 27₂₁, steigen also um 70%. Auf Grund des doppelten mittleren Fehlers

Tabelle IXb.

Variabilität der Gesamtkornzahl.

Rang Nr.	N a m e	V	m (V) ±	(M)	m (M) ±	Gruppe
1	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	24,86	1,152	256,01	4,169	niedrig
2	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	26,23	1,250	240,05	4,244	"
3	199 ₂₂ "	27,61	1,353	236,35	4,514	"
4	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	27,86	1,353	249,86	4,781	"
5	Eckendorfer	27,93	1,275	286,63	5,168	"
6	Egild	28,13	1,347	294,50	5,612	"
7	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	28,31	1,276	258,12	4,659	"
8	Friedrichswerther Berg	29,11	1,424	298,37	6,008	"
9	Eglfinger	29,86	1,486	288,47	6,060	"
10	Dr. Grundmanns Wotan	30,30	1,383	256,25	5,011	"
11	Janetzkis frühe	30,92	1,534	242,45	5,261	mittel
12	Strengs	32,41	1,479	277,42	5,803	"
13	Hanses Hübitzer	32,75	1,637	269,95	6,251	"
14	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	35,14	1,687	278,34	6,642	"
15	181 ₂₂ "	35,14	1,714	258,38	6,265	"
16	Janetzkis späte	36,89	1,961	233,50	6,474	hoch
17	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	39,10	1,847	250,58	6,547	"
18	Ackermanns Viktoria	40,40	1,884	245,13	6,530	"
19	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	42,36	1,790	279,43	7,074	"
			Dm (V) =4,77%		Dm(M) =2,14%	

der Differenz sind nur Sortenunterschiede gesichert, die höher sind als 5,10 V. Der allgemeine Grad der Sicherung ist nach dem mittleren Schwankungskoeffizienten $S = 2,67$ nur mittel-hoch. Die Mehrzahl der Sorten zeigt niedrige Variabilität, nur 5 gehören der Gruppe „mittel“ an, während 4 Sorten hohe Variabilität haben.

Ebenso wie die Standardabweichungen haben auch die Variationskoeffizienten keine festen Beziehungen zu ihren Mittelwerten. Dagegen stimmt ihre Rangordnung in großen Zügen mit der vom Gesamtkorngewicht, der Anzahl der Halme und dem Pflanzengewicht überein, ebenso wie sie überhaupt auch in der absoluten Höhe der Variationskoeffizienten gleich sind. Alle vier Eigenschaften bilden einen Komplex, der nur geringe Abweichungen in der Rangordnung erfährt. Wir finden demnach auch hier wieder unter den geringstvariablen die Sorten, die wir schon mehrfach an dieser Stelle getroffen haben.

Die Gesamtkornzahl als Auslesemoment ist bei der Höhe der Variationskoeffizienten sehr unsicher und hätte darum eigentlich auszuschneiden; da sie aber auf den Pflanzenertrag doch in mehrfacher Hinsicht Einfluß hat, wird sie vom Züchter nicht gern umgangen.

Gesamtkorngewicht. (Tabelle X a.)

Im Gegensatz zur Gesamtkornzahl weist das Gesamtkorngewicht nur mittlere Schwankungen der Sortenmittel auf. Es steigt von 10,09 g bei Janetzki früher W. G. bis zu 12,18 g bei Stamm 197₂₂, also nur um 2,09 g oder um 21% vom niedrigsten und 17% vom höchsten Pflanzenertrage. Der m (M) beträgt durchschnittlich 2,16%; als feststehende Sortenunterschiede sind nur solche zu betrachten, die über 0,8 g liegen. Nach dem mittleren Schwankungskoeffizienten $S = 2,40$ kommen gesicherte Sortenverschiedenheiten beim Gesamtkorngewicht am wenigsten von allen Eigenschaften zum Ausdruck. „Hohen“ Pflanzenertrag zeigen nur 4 Sorten, während die übrigen zu gleichen Teilen den Gruppen „mittel“ und „niedrig“ angehören.

Tabelle Xa.

Gesamtkorngewicht.

Rang-Nr.	Name	M	m (M)	σ	m (σ)	Grup- pe	Gewicht der ganz. Pflanze RO DZ $\frac{g}{M}$	Gesamt- kornzahl RO DZ M	Anzahl der Halme RO DZ M	Halm- ertrag RO DZ $\frac{g}{M}$	Tausend- korngewicht RO DZ $\frac{g}{M}$
1	Janetzki frühe	10,09	0,208	2,980	0,148	niedrig	1 019,75	4 3242,45	5 45,63	3 3 3	9 841,75
2	Ackermanns Viktoria	10,17	0,271	4,115	0,192	"	7 -521,65	5 -3245,13	10 -86,27	4 4	7 -540,96
3	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	10,18	0,276	4,132	0,195	"	2 120,49	7 4250,58	7 45,71	12 12	6 340,90
4	201 ₂₂	10,43	0,199	2,945	0,140	"	5 -121,59	3 1240,05	2 25,48	11 11	14 -1043,83
5	Hanses Hüblitzer	10,50	0,261	3,692	0,185	"	4 121,38	12 7269,95	16 -116,70	1 1	2 339,03
6	Janetzki späte	10,62	0,296	3,942	0,209	"	15 -922,31	1 5233,50	3 35,53	17 17	17 -1145,37
7	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	10,63	0,252	3,647	0,178	"	3 420,94	11 4258,38	13 -66,38	8 8	8 12,25
8	Dr. Grundmanns Wotan	10,65	0,197	3,050	0,139	"	6 221,65	9 -1256,25	6 25,70	13 13	12 -442,28
9	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	10,92	0,209	3,015	0,148	mittel	8 122,23	2 7236,35	8 15,75	16 16	18 -946,78
10	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	11,14	0,219	3,184	0,155	"	10 -022,52	6 4249,86	4 65,63	18 18	16 -644,53
11	Eglinger	11,27	0,250	3,551	0,177	"	13 -223,18	17 6288,47	12 -16,30	10 10	1 1038,98
12	Eckendorfer	11,30	0,208	3,217	0,140	"	9 322,26	16 4286,63	18 -66,77	5 5	4 839,64
13	Strengs	11,38	0,235	3,642	0,166	"	16 -323,95	13 0277,42	9 46,01	9 9	11 242,06
14	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliep- hackes 2 zl.)	11,41	0,182	2,778	0,129	"	11 322,90	8 6256,01	1 135,46	19 19	15 -144,51
15	Egild	11,45	0,224	3,310	0,158	"	14 123,26	18 3294,50	19 47,36	2 2	3 1239,08
16	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	11,62	0,299	5,000	0,211	hoch	18 -224,66	15 1279,43	17 -16,74	6 6	10 641,93
17	Friedrichswerther Berg	12,10	0,163	3,333	0,163	"	17 024,18	19 -2298,37	11 66,29	14 14	5 1240,80
18	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	12,15	0,298	4,391	0,211	"	19 -125,31	14 4278,34	15 36,50	15 15	7 543,60
19	197 ₂₂	12,18	0,225	3,523	0,159	"	12 723,17	10 9258,12	14 56,41	7 7	13 047,31
		Dm (M; = 2,16°)					46	74	90	114	116

*) RO = Rangordnung

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen.

Die Höhe des Gesamtkorngewichts wird wie der Halmertrag von der Kornzahl (Differenzzahl 74) und dem Tausendkorngewicht (Differenzzahl 116) bestimmt. Feste Beziehungen beider Eigenschaften zu ihm bestehen nicht, sondern es tritt immer eine Wechselwirkung ein. In der Gruppe „hoch“ beim Gesamtkorngewicht findet sich neben höchstem Tausendkorngewicht auch ganz geringes, z. B. bei Friedrichswerther Berg, hier ausgeglichen durch besonders hohe Kornzahl. Den entgegengesetzten Fall zeigt Hübitzer, die bei hoher Kornzahl, aber niedrigem Tausendkorngewicht nur geringen Pflanzenertrag bringt. Bei der Besprechung des Halmertrages wurde darauf hingewiesen, daß dieser teilweise im Stande ist, das Gesamtkorngewicht zu stützen; es ist dies z. B. bei Stamm 48₂₂ der Fall. Meist treten beide aber ohne Abhängigkeit nebeneinander (Differenzzahl 114), Egild hat z. B. hohen Pflanzenertrag bei nur sehr geringem Halmertrag. Zwischen Gesamtkorngewicht und Bestockung besteht nach der Differenzzahl 90 keine unmittelbare Beziehung. Gesamtkorngewicht und Pflanzengewicht gehen fast immer parallel (Differenzzahl 46). Als Ausnahme hiervon fällt Janetzki's späte W.G. auf, die trotz hohen Pflanzengewichts nur niedriges Gesamtkorngewicht besitzt. Dies erklärt sich aus der sehr geringen Gesamtkornzahl. Die Beziehung zum Kornprozent zeigt keine konstante Abhängigkeit, wir finden trotz hohen Korngewichts nur geringes Kornprozent bei Stamm 184₂₂, den umgekehrten Fall zeigt Janetzki's frühe W.G.

Variabilität des Gesamtkorngewichts.

(Tabelle X b.)

Trotz der geringen Mittelwerte steht das Gesamtkorngewicht in der Variabilität am höchsten von allen Eigenschaften, die Schwankungen der Variationskoeffizienten sind mittelgroß. Das niedrigste V hat Stamm 48₂₂ mit 24,34, das höchste Stamm 27₂₁ mit 43,14, die Steigerung beträgt also 78%. Der hohe mittlere Fehler bei dieser Eigenschaft läßt nur Sortenunterschiede über 5,28 V als gesichert erscheinen; solche finden sich nach dem mittleren Schwankungskoeffizienten $S = 2,84$ nur 30% weniger als bei V der

Halmlänge, wo die Erkennbarkeit der Sortenunterschiede am besten ist. Die Verteilung der Sorten über die drei Gruppen ist ähnlich wie bei der Gesamtkornzahl, mehr als die Hälfte der Sorten zeigt niedrige Variabilität, dagegen nur 4 Sorten hohe und 5 Sorten mittlere.

Der Vergleich der V-Rangordnungen von Gesamtkornzahl und Gesamtkorngewicht zeigt sehr weitgehende Übereinstimmung, Friedrichswerther Berg verbessert sich als einzige Sorte etwas beim Gesamtkorngewicht. In großen Zügen trifft auch die im Vorabschnitt schon erwähnte Parallelität mit der Variabilität der Halmzahl und des Pflanzengewichts wieder ein, auch mit dem Halmertrag. Hier zeigt sich Janetzki's späte W.G. beim Halmertrag viel weniger variabel als beim Gesamtkorngewicht. Eine feste Beziehung

Tabelle Xb.
Variabilität des Gesamtkorngewichts.

Rang Nr.	N a m e	V	m (V) ±	(M)	m (M) ±	Gruppe
1	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	24,34	1,128	11,41	0,182	niedrig
2	Friedrichswerther Berg	27,55	1,348	12,10	0,163	"
3	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	27,62	1,354	10,92	0,209	"
4	201 ₂₂ "	28,24	1,346	10,43	0,199	"
5	Eckendorfer	28,46	1,299	11,30	0,208	"
6	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	28,59	1,389	11,14	0,219	"
7	Dr. Grundmanns Wotan	28,64	1,307	10,65	0,197	"
8	Egild	28,90	1,384	11,45	0,224	"
9	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	28,93	1,304	12,18	0,225	"
10	Janetzki's frühe	29,53	1,466	10,09	0,208	"
11	Eglfinger	31,50	1,567	11,27	0,250	mittel
12	Strengs	32,02	1,461	11,38	0,235	"
13	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	34,31	1,674	10,63	0,252	"
14	Hanses Hübitzer	35,15	1,758	10,50	0,261	"
15	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	36,13	1,734	12,15	0,298	"
16	Janetzki's späte	37,09	1,971	10,62	0,296	hoch
17	Ackermanns Viktoria	40,48	1,888	10,17	0,271	"
18	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	40,58	1,913	10,18	0,276	"
19	27 ₂₁ "	43,14	1,823	11,62	0,299	"
		Dm (V) = 4,77%		Dm (M) = 2,16%		

von Mittelwert zu Variationskoeffizient besteht auch bei dieser Eigenschaft nicht. Während Stamm 27₂₁ mit hohem Mittelwert wieder die höchste Variabilität erreicht, zeichnet sich Friedrichswerther Berg bei gutem Pflanzenertrag durch besonders geringe Variabilität aus.

Das Gesamtkorngewicht ist als Auslesemoment nur von geringem Wert. Seine Variationskoeffizienten liegen zu hoch und zeigen dabei sehr hohe Unterschiede in den Sorten. Dazu kommt noch, daß es keine selbständige Eigenschaft darstellt, sondern von vielen Faktoren bestimmt wird.

Tausendkorngewicht. (Tabelle XI a.)

Das Tausendkorngewicht ist wohl bei allen Züchtern als Bewertungsmaßstab gebräuchlich. Ist es auch mehr als andere Eigenschaften den klimatischen Verschiedenheiten der einzelnen Jahre unterworfen, so zeigen sich doch bei ihm innerhalb einer Vegetationsperiode deutliche Sortenunterschiede. Wir finden eine Steigerung von 38,98 g bei Eglfinger bis zu 47,31 g bei Stamm 197₂₂ d. h. um 21% des niedrigsten und 18% des höchsten Wertes. Auf Grund des geringen m (M) von etwa 0,71% des Mittelwertes lassen sich Sortenunterschiede von über 1 g noch klar erfassen. Der mittlere Schwankungskoeffizient $S = 5,18$ ergibt eine genügende Sicherung der Sortenverschiedenheiten im allgemeinen. Mehr als die Hälfte der Sorten weist „niedriges“ Tausendkorngewicht auf, während nur drei in der „hohen“ Gruppe stehen.

Wie wir schon beim Halmertrag und Gesamtkorngewicht sahen, sind diese vom Tausendkorngewicht in hohem Maße abhängig. Daß beim Gesamtkorngewicht die Bestockung eine andere Richtung des Einflusses herbeiführt als beim Halmertrag, zeigen die Differenzzahlen 116 gegen 68. Den weitesten Einfluß auf das Tausendkorngewicht hat die Halmzahl (Differenzzahl 158). In den meisten Fällen ist bei niedriger Halmzahl die Kornausbildung besser. Stamm 197₂₂ hat trotz starker Bestockung und mittlerer Kornzahl doch ein sehr gutes Tausendkorngewicht, die Sorte kann infolge

Tabelle XI a.

Tausendkorngewicht.

Rang-Nr.	N a m e	M	m (M)	σ	m (σ)	Grup- pe	Anzahl der Halme (*)	Achren- zahl	Achren- dichte	Gesamt- kornzahl	Korn- prozent										
		g	+		+		RO	DZ	M	RO	DZ	M	RO	DZ	M						
1	Eglinger	38,98	0,304	4,325	0,215	niedrig	12	11	6,30	10	9	21,50	3	2	28,31	17	16	288,47	6	5	48,34
2	Hanses Hübiter	39,03	0,301	4,250	0,212	"	16	14	6,70	7	5	21,18	18	16	31,05	12	10	269,95	8	6	48,88
3	Egild	39,08	0,292	4,308	0,206	"	19	16	7,36	6	3	21,17	10	7	30,19	18	15	294,50	9	6	49,00
4	Eckendorfer	39,64	0,248	3,836	0,175	"	18	14	6,77	8	4	21,43	9	5	30,08	16	12	286,63	17	13	50,83
5	Friedrichswerther Berg	40,80	0,310	4,481	0,219	"	11	6	6,29	19	14	23,14	14	9	30,52	19	14	298,37	15	10	49,67
6	194 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	40,90	0,384	5,751	0,272	"	7	1	5,71	17	11	23,05	17	11	31,04	7	1	250,58	13	7	49,38
7	Ackemanns Viktoria	40,96	0,229	3,475	0,162	"	10	3	6,27	1	6	19,49	2	5	28,31	5	2	245,13	2	5	46,66
8	181 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	41,63	0,349	5,055	0,247	"	13	5	6,38	4	4	20,66	7	1	29,62	11	3	258,38	16	8	50,27
9	Janetzki frühe	41,75	0,274	3,910	0,194	"	5	4	5,63	13	4	21,83	12	3	30,32	4	5	242,45	18	9	51,26
10	27 ²¹ (Eckendorfer × Schwarze)	41,93	0,362	6,049	0,256	mittel	17	7	6,74	5	5	20,76	4	6	28,81	15	5	279,43	4	6	47,30
11	Strengs	42,06	0,311	4,816	0,220	"	9	2	6,01	12	1	21,75	5	6	28,83	13	2	277,42	3	8	46,72
12	Dr. Grundmanns Wotan	42,28	0,322	4,983	0,227	"	6	6	5,70	15	3	22,13	11	1	30,28	9	3	256,25	10	2	49,10
13	184 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	43,60	0,316	4,661	0,224	"	15	2	6,50	9	4	21,44	19	6	32,51	14	1	278,34	5	8	48,26
14	201 ²² (4 zl. aus Schlep- hackes 2 zl.)	43,83	0,307	4,557	0,217	"	2	12	5,48	14	0	21,97	16	2	30,73	3	11	240,05	7	7	48,40
15	49 ²² (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	44,51	0,246	3,750	0,174	"	1	14	5,46	18	3	23,11	13	2	30,35	8	7	256,01	11	4	49,20
16	41 ²² (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	44,53	0,282	4,103	0,199	"	4	12	5,62	16	0	22,42	8	8	30,03	6	10	249,86	12	4	49,29
17	Janetzki späte	45,37	0,361	4,805	0,255	hoch	3	14	5,53	11	6	21,53	6	11	29,48	1	16	233,50	1	16	45,89
18	199 ²² (Eckendorfer × Schwarze)	46,78	0,229	3,306	0,162	"	8	10	5,75	2	16	20,22	1	17	28,18	2	16	236,35	14	4	49,55
19	197 ²² *	47,31	0,315	4,943	0,223	"	14	5	6,41	3	16	20,64	15	4	30,73	10	9	258,12	19	0	52,25
			Dm (M) -0,71%				158		114		122		158		128						

*) RO = Rangordnung

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen

ihrer kurzen Ähre mehr Nährstoffe dem einzelnen Korn zugute kommen lassen. Von dem gegensinnigen Einfluß, den die Ährchendichte auf das Tausendkorngewicht hat (Differenzzahl 122), indem sie durch größere oder geringere Platzgabe die Entwicklung der Körner fördert oder hemmt, war bei der Besprechung dieser Eigenschaft schon die Rede.

Nicht zu vergessen ist als höchwichtiger Faktor für die Entwicklung des Korns die eingangs schon erwähnte Witterung nach der Blüte. Schweres Lager kann die Kornausbildung ganz unterbinden, Trockenheit in der Nachblütezeit die frühen Sorten vor den späten benachteiligen, wie es in unserer Aufstellung tatsächlich die Sorten der Mammuth-Abstammung, Eckendorfer, Hübitzer und Egild neben Eglfinger zeigen. Auffallend ist hier besonders, daß Hübitzer, trotzdem sie besonders auf Trockenheitsresistenz gezüchtet ist, sehr stark auf die Trockenheit reagiert hat. Den späteren Sorten kam die einige Zeit darauf einsetzende Regenperiode noch zu gute. Die Witterungsfaktoren gebieten also zwar eine gewisse Einschränkung der Bewertung des Tausendkorngewichts, doch ist durch ihre Gleichartigkeit während einer Versuchs- und Vegetationsperiode der relative Wert des Sortenvergleichs gesichert, es zeigt sich ganz deutlich die Anpassungsfähigkeit der Sorte an die klimatischen Verhältnisse.

Variabilität des Tausendkorngewichts. (Tabelle XIb).

Die Variationskoeffizienten beim Tausendkorngewicht können schlechthin noch als niedrig bezeichnet werden, obwohl sie teilweise schon über 11V liegen. In der Variabilität zeigen sich große Schwankungen zwischen den extremen Sorten; sie steigt von 7,07V bei Stamm 199₂₂ um 104% bis 14,43V bei Stamm 27₂₁ also um über das Doppelte. Der zweifache mittlere Fehler der Differenz gestattet noch Sortenunterschiede über 1,57V; nach dem mittleren Schwankungskoeffizienten $S=2,59$, der um 35% kleiner ist als bei V der Halmlänge, treten diese in der Tabelle auch gut hervor. Hohe Variabilität zeigen nur 2 Sorten, während

die Mehrzahl der Sorten der Gruppe „mittel“ und 5 der Gruppe „niedrig“ angehören.

Die großen Schwankungen in der Höhe der Variabilität hängen nicht etwa mit den bei der Besprechung der Mittelwerte gestreiften Vegetationseinflüssen zusammen. Eine Beziehung, die diese Auffassung stützen könnte, läßt sich weder für σ noch für V im Verhältnis zu ihren Mittelwerten herstellen. Selbst wenn man aus dem Umstand, daß die Rangordnung der Mittelwerte bei den Variationskoeffizienten in großen Zügen eine Umkehrung erfährt, den Schluß ziehen wollte, daß hohes Tausendkorngewicht geringere Variabilität besäße als niedriges, vielleicht auch noch in Verbindung damit, daß späte Sorten weniger variabel wären, so ist diese Annahme doch durch sehr gewichtige Ausnahmen durchbrochen:

Tabelle Xlb.
Variabilität des Tausendkorngewichts.

Rang Nr.	N a m e	V	m (V)	(M)	m (M)	Gruppe
1	199 ₂₂ (Eckendorfer $\times$ Schwarze)	7,07	0,347	46,78	0,229	niedrig
2	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	8,43	0,390	44,51	0,246	.
3	Ackermanns Viktoria	8,46	0,396	40,96	0,229	.
4	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	9,21	0,447	44,53	0,282	.
5	Janetzkis frühe	9,37	0,465	45,37	0,361	.
6	Eckendorfer	9,68	0,442	39,64	0,248	mittel
7	201 ₂₂ (Eckendorfer $\times$ Schwarze)	10,40	0,496	43,83	0,307	.
8	197 ₂₂ "	10,45	0,471	47,31	0,315	.
9	Janetzkis späte	10,59	0,563	45,37	0,361	.
10	184 ₂₂ (Eckendorfer $\times$ Schwarze)	10,69	0,513	43,60	0,316	.
11	Hanses Hübitzer	10,89	0,545	39,03	0,301	.
12	Friedrichswerter Berg	10,98	0,537	40,80	0,310	.
13	Egild	11,03	0,528	39,08	0,292	.
14	Eglfinger	11,09	0,552	38,98	0,304	.
15	Strengs	11,45	0,523	42,06	0,311	.
16	Dr. Grundmanns Wotan	11,79	0,538	42,06	0,311	.
17	181 ₂₂ (Eckendorfer $\times$ Schwarze)	12,14	0,593	41,63	0,349	.
18	194 ₂₂ "	14,06	0,664	40,90	0,384	hoch
19	27 ₂₁ "	14,43	0,610	41,93	0,362	.
			Dm. V) =4,77%		Dm. (M) =0,71%	

Die vorerwähnten, frühen Sorten mit geringem Sortenmittel, bei denen auf Grund des Witterungseinflusses eigentlich höhere Variationskoeffizienten erwartet werden müßten, finden sich in bunter Reihe auf die mittlere Gruppe verstreut. Es muß also vielmehr die größere oder kleinere Variabilität Sorteneigenschaft sein. Wir finden auch bei dieser Tabelle, daß bestimmte Sorten, wie Stamm 194₂₂ und 27₂₁, zu hoher Variabilität neigen, während die Stämme 199₂₂ und 48₂₂ auch hier die größere Konstanz zeigen. Zu anderen V-Rangordnungen findet sich keine nähere Beziehung.

Die im allgemeinen nur geringe bis mittlere Höhe der Variabilität des Tausendkorngewichts und sein wichtiger Einfluß auf den Kornertrag weisen trotz der gewissen äußeren Einflüsse, die es durch die ungünstige Witterung erfahren kann, darauf hin, daß das Tausendkorngewicht als Bewertungsfaktor sehr wohl zu benutzen ist. Es wird daher auch mit gutem Erfolg zur Sortencharakteristik herangezogen. Nebenbei sei bemerkt, daß es auch in der großen Praxis eine ausschlaggebende Rolle spielt und zwar bei der Berechnung der Aussaatstärke, weil sich in ihm Korngröße und bis zu gewissem Grade auch die innere Qualität des Korns wieder spiegeln.

Kornprozent. (Tabelle XII a).

Das Kornprozent, der Anteil des Kornertrags an der Gesamtpflanze, ist für den Züchter wichtig, weil es die Ertragsfähigkeit der Sorte ausdrückt. Die Schwankungsextreme sind bei dieser Eigenschaft nicht groß, das geringste Kornprozent hat Janetzki's späte W. G. mit 45,89%, das höchste 197₂₂ mit 52,25%; wir sehen also nur eine Steigerung um 14% des niedrigsten und 12% des höchsten Sortenmittels. Der $m(M)$ beträgt durchschnittlich 0,55% des Mittelwertes. Sortenunterschiede über 1 g sind als sicher anzusehen, nach dem mittleren Schwankungskoeffizienten $S=4,42$ sind sie nicht in großer Zahl in der Tabelle sicher zu erkennen. 11 Sorten zeigen „mittleres“ Kornprozent, nur je 4 gehören den Gruppen „niedrig“ und „hoch“ an.

Tabelle Xlla.

Kornprozent.

Rang-Nr.	N a m e	M	m(M) ±	σ ±	m(σ) ±	Grup- pe	Gewicht der ganz. Pflanze (σ) RO DZ $\bar{M}$	Anzahl der Halme RO DZ M	Tausend- korngewicht RO DZ $\bar{M}$	Gesamt- korngewicht RO DZ $\bar{M}$	Spindel- länge cm RO DZ M		
1	Janetzki späte	45,89	0,352	4,685	0,249	niedrig	15 — 1422,31	3 — 2	5,5317	— 1645,37	6 — 510,62	13 — 12	7,31
2	Ackermanns Viktoria	46,69	0,248	3,759	0,175	"	7 — 521,05	10 — 8	6,277	— 540,96	2 — 010,17	4 — 2	6,88
3	Strengs	46,72	0,285	4,408	0,201	"	16 — 1323,95	9 — 6	6,0111	— 742,06	13 — 1011,38	16 — 13	7,54
4	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	47,30	0,349	5,843	0,247	"	18 — 1424,66	17 — 13	6,7410	— 1547,33	16 — 1211,62	12 — 8	7,21
5	184 ₂₂ "	48,26	0,275	4,047	0,194	mittel	19 — 1425,31	15 — 10	6,5013	— 843,60	18 — 1312,15	1 — 4	6,62
6	Eglinger	48,34	0,238	3,383	0,168	"	13 — 723,18	12 — 6	6,301	— 538,98	11 — 511,27	19 — 13	7,63
7	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	48,40	0,289	4,284	0,204	"	5 — 221,59	2 — 5	5,4814	— 743,83	4 — 310,43	8 — 1	7,14
8	Hanses Hübitzer	48,88	0,261	3,688	0,184	"	4 — 421,38	16 — 8	6,702	— 639,03	5 — 310,50	3 — 5	6,82
9	Egild	49,00	0,305	4,506	0,216	"	14 — 523,26	19 — 10	7,363	— 639,08	15 — 611,45	7 — 2	7,03
10	Dr. Grundmanns Wotan	49,10	0,206	3,185	0,145	"	6 — 421,65	6 — 4	5,7012	— 242,28	8 — 210,65	14 — 4	7,32
11	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliep- hackes 2 zl.)	49,20	0,194	2,955	0,137	"	11 — 022,90	1 — 10	5,4615	— 444,51	14 — 311,41	18 — 7	7,62
12	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	49,29	0,222	3,239	0,157	"	10 — 222,52	4 — 8	5,6316	— 444,53	10 — 211,14	15 — 3	7,46
13	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	49,38	0,336	5,023	0,237	"	2 — 1120,49	7 — 6	5,716	— 740,90	3 — 1010,18	10 — 3	7,21
14	192 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	49,55	0,242	3,490	0,171	"	8 — 622,23	8 — 6	5,7518	— 446,78	9 — 510,92	5 — 9	6,96
15	Friedrichswerther Berg	49,67	0,309	3,464	0,218	"	17 — 224,18	11 — 4	6,295	— 1040,80	17 — 212,10	17 — 2	7,57
16	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	50,27	0,315	4,572	0,223	hoch	3 — 1320,94	13 — 3	6,388	— 841,63	7 — 910,63	6 — 10	6,99
17	Eckendorfer	50,83	0,201	3,118	0,142	"	9 — 822,26	18 — 1	6,774	— 1339,64	12 — 511,30	9 — 8	7,19
18	Janetzki frühe	51,26	0,253	3,598	0,179	"	1 — 1719,75	5 — 13	5,639	— 941,75	1 — 1710,09	11 — 7	7,21
19	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	52,25	0,194	3,038	0,137	"	12 — 723,17	14 — 5	6,4119	— 047,31	19 — 012,18	2 — 17	6,71
			Dm (M) = 0,559 ⁹⁶	3,038	0,137	"	148	128	128	112	130		

*) RO = Rangordnung.

**) DZ = Differenz der verglichenen Rangordnungen.

Vom Kornprozent zum Gewicht der ganzen Pflanze herrscht Gegensinnigkeit der Beziehungen vor, die Differenzzahl beider Rangordnungen ist 148. Starke Ausbildung der ganzen Pflanze wird den Kornanteil an ihr zurücktreten lassen. Finden sich von dieser Norm Ausnahmen, so werden sie leicht durch das Gesamtkorngewicht erklärt: Ackermanns Viktoria hat trotz geringen Pflanzengewichts doch ein geringes Kornprozent, weil ihr Korngewicht nur sehr niedrig ist. Die entgegengesetzte Erscheinung zeigt Friedrichswerther Berg.

Nach diesen Beispielen ist es auch einleuchtend, daß das Gesamtkorngewicht wie der Halmertrag zum Kornprozent in gar keinem festen Verhältnis stehen. Wenn sie auch mehr zu gegensinniger Beeinflussung neigen (Differenzzahlen 112 und 122), so finden wir ebensogut auch Fälle, die die eigentlich erwartete Gleichsinnigkeit von Gesamtkorngewicht zum Kornprozent zeigen. Die Höhe des Kornprozents entstammt mehr einer Wechselwirkung zwischen Pflanzengewicht und Gesamtkorngewicht als dem direkten Einfluß eines beider Faktoren. Schwache Gegensinnigkeit findet sich zu Halmhöhe und Halmzahl (Differenzzahlen 134 und 128), weil beide den Strohanteil der Pflanze beeinflussen; doch sind diese Beziehungen sehr lose.

Variabilität des Kornprozents.

(Tabelle XII b).

Die Variationskoeffizienten des Kornprozents sind niedrig, sie bewegen sich um 9 herum. Die geringste Variabilität zeigt Stamm 197₂₂ mit 5,81 V, die höchste Stamm 27₂₁ mit 12,35 V. Die Variabilität zeigt also mit einer Steigerung um 113% des geringsten V große Schwankungen zwischen den extremen Sorten. Der doppelte mittlere Fehler der Differenz läßt Sortenunterschiede über 1,31 V als gesichert ansehen; nach dem mittleren Schwankungskoeffizienten $S = 3,73$ treten sie nur wenig schwächer als bei V der Halmhöhe zutage. Die Hälfte der Sorten weist niedrige Variabilität auf, während sich nur 4 in der Gruppe „hoch“ und 7 unter „mittel“ finden.

Eine Beziehung von M zu den zugehörigen V läßt sich nicht entdecken. Daß Stamm 197₂₂ das beste Kornprozent mit der geringsten Variabilität verbindet, hebt ihn, wie schon wiederholt, aus der Zahl der übrigen Sorten hervor. Stamm

Tabelle XIIb.
Variabilität des Kornprozents.

Rang Nr.	N a m e	V	m(V) ±	M	m(M) ±	Gruppe
1	197 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	5,81	0,262	52,25	0,194	niedrig
2	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	6,01	0,278	49,20	0,194	"
3	Eckendorfer	6,13	0,280	50,83	0,201	"
4	Dr. Grundmanns Wotan	6,49	0,296	49,10	0,206	"
5	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Gold- thorpe)	6,57	0,319	49,29	0,222	"
6	Eglfinger	6,99	0,348	48,34	0,238	"
7	Janetzkis frühe	7,02	0,348	51,26	0,253	"
8	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	7,04	0,345	49,55	0,242	"
9	Hanses Hübitzer	7,55	0,377	48,88	0,261	"
10	Ackermanns Viktoria	8,05	0,375	46,69	0,248	mittel
11	184 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	8,39	0,403	48,26	0,275	"
12	201 ₂₂ "	8,85	0,422	48,40	0,289	"
13	Friedrichswerther Berg	8,99	0,440	49,67	0,309	"
14	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	9,09	0,444	50,27	0,315	"
15	Egild	9,19	0,440	49,00	0,305	"
16	Strengs	9,43	0,431	46,72	0,285	"
17	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	10,17	0,481	49,38	0,336	hoch
18	Janetzkis späte	10,21	0,543	45,89	0,352	"
19	27 ₂₁ (Eckendorfer × Schwarze)	12,35	0,522	47,30	0,349	"
			Dm (V) = 4,77%		Dm (M) = 0,55%	

48₂₂ gehört wie immer zu den konstantesten. Der Vergleich mit den V-Rangordnungen anderer Eigenschaften zeigt keinerlei Berührungspunkte, die auf eine geregelte Beziehung hindeuten könnten.

Seine geringe Variabilität läßt das Kornprozent zur Zuchtarbeit durchaus geeignet erscheinen.

Die durchschnittliche Variabilität der Einzelsorten.

Aus der Zusammenstellung der Variationskoeffizienten in der Übersichtstabelle wurde für jede Sorte der mittlere Variationskoeffizient errechnet, um so ein Durchschnittsbild von der Variabilitätshöhe und dem Stand der Ausgeglichenheit bei den einzelnen Sorten zu erhalten. Es ergab sich hierbei, daß im allgemeinen die nämlichen Sorten mit höherer bzw. niedrigerer Variabilität hervortraten, die uns in dieser Hinsicht bei den Einzeleigenschaften schon begegnet waren.

Die Reihenfolge der Sorten nach dem durchschnittlichen Variationskoeffizienten ist folgende:

Rang	Sorte	V- Durchschnitt
1	48 ₂₂ (4 zl. aus Schliephackes 2 zl.)	12,79
2	199 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	13,43
3	197 ₂₂ „	14,75
4	41 ₂₂ (Hohenheimer frühe Goldthorpe)	14,75
5	Eckendorfer	14,76
6	201 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	15,00
7	Friedrichswerther Berg	15,06
8	Egild	15,17
9	Dr. Grundmanns Wotan	15,19
10	Janetzkis frühe W. G.	15,65
11	Eglfinger	16,26
12	Hanses Hübitzer	16,42
13	Strengs	16,53
14	181 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	17,88
15	184 ₂₂ „	18,23
16	Janetzkis späte W. G.	18,48
17	Ackermanns Viktoria	19,44
18	194 ₂₂ (Eckendorfer × Schwarze)	19,57
19	27 ₂₁ „	21,39

Zusammenstellung

der Mittelwerte mit Rangordnung.

Sorte	Halm- länge cm	Anzahl d. Halme	Gewicht d. ganzen Pflanze g	Spindel- länge cm	Ähren- zahl	Ähren- dicke	Kornzahl/ d. längst. Halmes	Korn- gew. d. längst. Halmes g	Gesamt- kornzahl	Gesamt- korn- gewicht g	Tausend- korn- gewicht g	Korn- prozent												
Ackermanns Viktoria	133,06	15	6,27	10	21,65	7	6,88	4	19,49	1	28,31	2	45,73	1	2,04	4	245,13	5	10,17	2	40,96	7	46,69	2
Egflinger	142,77	19	6,30	12	23,18	13	7,63	19	21,50	10	28,81	3	55,13	17	2,26	10	288,47	17	11,27	11	38,98	1	48,34	6
Janetzki's späte	124,89	3	5,53	3	23,77	5	7,31	13	21,53	11	29,48	6	51,99	10	2,45	17	233,50	1	10,62	6	45,37	17	45,89	1
Strengs	134,57	18	6,01	9	23,95	16	7,54	16	21,75	12	28,83	5	52,38	12	2,26	9	277,42	13	11,38	13	42,06	11	46,72	3
Dr. Grundmanns																								
Wotan	129,22	11	5,70	6	21,65	6	7,32	14	22,13	15	30,28	11	53,09	14	2,29	13	256,25	9	10,05	8	42,28	12	49,10	10
Eckendorfer	127,93	7	6,77	18	22,26	9	7,19	9	21,43	8	30,08	9	50,36	7	2,05	5	286,63	16	11,30	12	39,64	4	50,83	17
Egild	125,65	4	7,36	19	23,26	14	7,03	7	21,17	6	30,19	10	48,40	3	1,90	2	294,50	18	11,45	15	39,08	3	49,00	9
Hannes Hübiter	126,23	5	6,70	16	21,38	4	6,82	3	21,18	7	31,05	18	47,14	2	1,88	1	269,95	12	10,50	5	39,03	2	48,88	8
Janetzki's frühe	129,01	9	5,63	5	19,75	1	7,21	11	21,83	13	30,32	12	49,29	5	2,03	3	242,45	4	10,09	1	41,75	9	51,26	18
Friedrichswarth, Berg	127,95	8	6,29	11	24,18	17	7,57	17	23,14	19	30,52	14	55,43	18	2,30	14	298,37	19	12,10	17	40,80	5	49,67	15
27 ²¹ (Eckendorfer × Schwarze)	118,04	1	6,74	17	24,66	18	7,21	12	20,76	5	28,81	4	51,92	9	2,23	6	279,43	15	11,62	16	41,93	10	47,30	4
181 ²²	126,63	6	6,38	13	20,94	3	6,99	6	20,66	4	29,62	7	50,78	8	2,25	8	258,38	11	10,63	7	41,63	8	50,27	16
184 ²²	134,38	16	6,50	15	25,31	19	6,62	1	21,44	9	32,51	19	52,39	13	2,32	15	278,34	14	12,15	18	43,60	13	48,26	5
194 ²²	129,21	10	5,71	7	20,49	2	7,21	10	23,05	17	31,04	17	53,60	15	2,28	12	250,58	7	10,18	3	40,90	6	49,38	13
197 ²²	121,86	2	6,41	14	23,17	13	6,71	2	20,64	3	30,73	15	48,56	4	2,25	7	258,12	10	12,18	19	47,31	19	52,25	19
199 ²²	132,88	14	5,75	8	22,23	8	6,96	5	20,22	2	28,08	1	50,12	6	2,33	16	236,35	2	10,92	9	46,78	18	49,55	14
201 ²²	130,03	12	5,48	2	21,59	5	7,14	8	21,97	14	30,73	16	52,33	11	2,28	11	240,05	3	10,43	4	43,83	14	48,40	7
41 ²² (aus Hohenh. früh. Goldthorpe)	134,48	17	5,63	4	22,52	10	7,46	15	22,42	16	30,03	8	54,46	16	2,46	18	249,86	6	11,14	10	44,53	16	49,29	12
48 ²² (aus Schliep- hackes 2 zl.)	130,11	13	5,46	1	22,90	11	7,62	18	23,11	18	30,35	13	56,18	19	2,52	19	256,01	8	11,41	14	44,51	15	49,20	11

Die jeweils niedrigsten und höchsten Mittelwerte sind fettgedruckt.

Zusammenstellung

der Variationskoeffizienten mit Rangordnung.

Sorte	Halm- länge		Anzahl d. Halme		Gewicht d. ganzen Pflanze		Spindel- länge		Ährchen- zahl		Ährchen- dichte		Kornzahl d. längst. Halmes		Gesamt- kornzahl		Gesamt- korngew.		Tausend- korngew.		Korn- prozent			
	cm		cm		cm		cm		cm		cm		g		g		g		g		g			
Ackermanns Viktoria	2,75	13	36,59	18	41,19	18	8,88	13	11,16	18	4,84	16	12,36	9	18,08	15	40,40	18	40,48	17	8,48	3	8,05	10
Eglinger	2,61	11	28,12	12	33,35	14	7,95	6	9,45	10	4,06	11	12,33	8	17,76	14	29,86	9	31,50	11	11,09	14	6,99	6
Janetzki's späte	3,22	18	35,84	17	36,37	15	10,57	16	8,31	4	4,85	17	12,31	7	15,56	5	36,89	16	37,09	17	10,59	9	10,21	18
Strengs	3,01	15	29,34	13	30,96	11	8,22	9	8,82	8	4,04	10	12,12	5	16,48	7	32,41	12	32,02	12	11,45	15	9,43	16
Dr. Grundmanns																								
Wotan	1,75	1	26,92	10	27,67	7	8,42	10	9,76	16	3,29	4	12,75	11	14,52	3	30,30	10	28,64	7	11,79	16	6,49	4
Eckendorfer	1,84	3	25,18	7	28,00	8	8,16	8	9,51	11	3,45	6	12,10	4	16,71	10	27,93	5	28,46	5	9,86	6	6,13	3
Egild	2,60	10	22,09	4	25,59	2	7,85	3	9,44	9	4,35	12	13,29	12	19,58	16	28,13	6	28,90	8	11,03	13	9,19	15
Hanses Hübitzer	2,71	12	18,28	1	32,43	13	9,22	15	9,68	15	3,36	5	15,14	16	19,86	17	32,75	13	35,15	14	10,89	11	7,55	9
Janetzki's frühe	1,86	4	27,40	11	28,48	10	8,86	12	9,56	12	4,47	14	13,67	13	16,70	9	30,92	11	29,53	10	9,37	5	7,02	7
Friedrichswerth. Berg	3,21	17	20,45	3	27,52	6	7,85	4	7,89	2	4,50	15	16,12	19	16,49	8	29,11	8	27,55	2	10,98	12	8,99	13
27 ₂₁ (Eckendorfer																								
X Schwarze)	2,55	9	35,84	16	41,96	19	11,71	19	11,22	19	5,23	18	15,77	18	20,16	18	42,36	19	43,14	19	14,43	19	12,35	19
181 ₂₂	3,00	14	30,35	14	31,89	12	11,11	17	10,82	17	4,35	13	15,20	17	17,11	13	35,14	15	34,31	13	12,14	17	9,09	14
184 ₂₂	3,02	16	31,90	15	36,59	16	11,32	18	9,57	13	6,42	19	12,56	10	17,01	11	35,14	15	36,13	15	10,69	10	8,39	11
194 ₂₂	3,76	19	36,93	19	37,60	17	7,88	5	8,10	3	4,00	8	11,83	3	20,80	19	39,10	17	40,58	18	14,06	18	10,17	17
197 ₂₂	2,36	7	25,46	8	27,06	5	8,47	11	8,62	6	3,28	3	12,19	6	16,01	6	28,31	7	28,93	9	10,45	8	5,81	1
199 ₂₂	2,38	8	18,49	2	26,91	4	7,11	2	8,58	5	4,02	9	11,27	2	13,00	1	27,61	3	27,62	3	7,07	1	7,04	8
201 ₂₂	1,82	2	24,40	6	26,47	3	8,95	14	9,63	14	3,55	7	14,89	15	17,05	12	26,23	2	28,24	4	10,40	7	8,85	12
41 ₂₂ (aus Hohenh.																								
früh. Goldthorpe)	2,03	6	26,19	9	28,07	9	7,95	7	8,72	7	2,85	2	13,71	14	15,27	4	27,86	4	28,59	6	9,21	4	6,57	5
48 ₂₂ (aus Schliep-																								
hackes 2 zeil.)	1,87	5	22,57	5	23,32	1	7,10	1	7,71	1	2,54	1	11,27	1	13,41	8	24,86	1	24,34	1	8,43	2	6,01	2

Die jeweils niedrigsten und höchsten Variationskoeffizienten sind fettgedruckt.

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse.

Um einen besseren Vergleich der einzelnen Sorten in ihren Eigenschaften zu ermöglichen, wurden die Mittelwerte und Variationskoeffizienten in den beiden vorangehenden Übersichtstabellen angeordnet und ihre Wertigkeit durch Hinzufügung der Rangordnungsziffern gekennzeichnet. Die höchsten und niedrigsten Werte wurden durch Fettdruck hervorgehoben.

Die Untersuchungsergebnisse lassen sich folgendermaßen kurz zusammenfassen:

Die Länge des längsten Halmes zeigt zwar im Vergleich zu anderen Eigenschaften nur mittelhohe Unterschiede zwischen den Extremen „kurz“ und „lang“, auf Grund des geringen mittleren Fehlers lassen sich aber gesicherte Unterschiede von Sorte zu Sorte bei ihr am klarsten erkennen. Die meisten Sorten sind mittellang. Eine feste Beziehung zu einer anderen Eigenschaft besteht nicht, auch nicht zur Spindellänge, es treten hier vielmehr alle Kombinationen beider Eigenschaften auf. Zur Bestockung, dem Pflanzengewicht, der Gesamtkornzahl und dem Gesamtkorngewicht bestehen schwach gegensinnige Beziehungen.

Bei der Anzahl der Halme sind die Sortenschwankungen am höchsten, jedoch ist der $m(M)$ hoch, und daher sind gesicherte Sortenunterschiede nur in weiteren Grenzen zu erkennen. In der Halmzahl spiegelt sich eine mehr oder weniger große Sensibilität der Sorten gegenüber den wechselnden Herbsttemperaturen wieder; die frühen Sorten scheinen, weil sie eine stärkere Bestockung zeigen, auch geringere Temperaturen noch für ihre Vegetation verwerten zu können. Auch der Wuchstyp der jungen Pflanze mag auf den Bestockungsgrad Einfluß haben. Eine feste Parallelität der Beziehungen besteht zu anderen Eigenschaften

nicht, angedeutet ist sie zur Gesamtkornzahl, dagegen ist die Bestockung auf die Ausbildung des Einzelhalmes, dessen Spindellänge und Ährchenzahl von Einfluß.

Das Gewicht der ganzen Pflanze zeigt zwar hohe Schwankungen zwischen den extremen Sorten, aber bei der großen Höhe des $m(M)$ sind Unterschiede von Sorte zu Sorte nur schwer zu erkennen. Das Pflanzengewicht setzt sich aus mehreren in Wechselwirkung stehenden Faktoren zusammen, der Halmzahl, dem Halmertrag und dem Gesamtkorngewicht. Zu letzterem zeigt es meist gute Gleichsinnigkeit der Beziehungen.

Die Spindellänge des längsten Halmes weist zwar nur geringe Verschiedenheiten zwischen den beiden extremen Sortenmitteln auf, aber Unterschiede von Sorte zu Sorte sind noch gut zu erkennen, weil der $m(M)$ sehr gering ist. Die Spindellänge ist z. T. von der Stärke der Bestockung abhängig. Zur Ährchenzahl bestehen keine direkten Beziehungen, die Ährchendichte tritt hier als Mitbestimmungsfaktor zwischen beide Eigenschaften.

In der Ährchenzahl des längsten Halmes sind die Sortenschwankungen ebenfalls nicht groß, jedoch lassen sich auf Grund des geringen mittleren Fehlers Sortenunterschiede noch gut erfassen. Die Ährchenzahl wird durch stärkere Bestockung in ihrer Höhe beeinflusst. Der Prozentsatz der Taubheitsveranlagung ist bei den Sorten sehr abgestuft, er schwankt zwischen 13 und 24%. Eine Gleichsinnigkeit zwischen Ährchenzahl und Taubheitsprozentsatz besteht nicht, wie erwartet; es findet sich das gegensinnige Verhalten beider vielmehr in überwiegendem Maße.

Die Ährchendichte D des längsten Halmes zeigt zwar geringe Unterschiede der beiden extremen Sorten, aber bei dem geringen $m(M)$ treten gesicherte Verschiedenheiten von Sorte zu Sorte trotzdem sehr klar hervor. Die Ährchendichte steht zur Ährchenzahl in keiner festen Beziehung, sondern bei ihr wirkt die Spindellänge mitbestimmend. Zum Tausendkorngewicht besteht schwache Gegensinnigkeit des Einflusses.

Die Kornzahl des längsten Halmes zeigt mittelhohe Schwankungen zwischen den extremen Sorten wie auch eine mittelstarke Sicherung von Sortenunterschieden. Die Kornzahl beruht auf der Wechselwirkung von Ährchenzahl und Taubheitsanlage, zu jener besteht Gleichsinnigkeit der Beziehungen, zu dieser Gegensinnigkeit. Zur Ährchendichte bestehen keine festen Beziehungen, ebenso nicht zur Gesamtkornzahl, zum Halmertrag herrscht Gleichsinnigkeit.

Das Korngewicht des längsten Halmes unterliegt sehr hohen Schwankungen zwischen den extremen Werten, jedoch sind Unterschiede von Sorte zu Sorte infolge des hohen m (M) nicht dementsprechend klar zu erfassen. Der Halmertrag wird gebildet aus der Kornzahl und dem Tausendkorngewicht. Zu den beiden Eigenschaften besteht im allgemeinen Parallelität der Beziehungen, teilweise tritt auch eine Wechselwirkung zwischen ihnen ein. Zur Ährchendichte herrscht schwache Gegensinnigkeit. Der Halmertrag wird durch die Höhe der Halmzahl und Gesamtkornzahl eingeschränkt. Zum Gesamtkorngewicht zeigt sich schwache Gegensinnigkeit der Beziehungen.

Die Gesamtkornzahl zeigt zwar hohe Schwankungen zwischen dem höchsten und niedrigsten Sortenmittel, aber durch den sehr hohen m (M) kommen gesicherte Unterschiede von Sorte zu Sorte nur in geringer Zahl zum Ausdruck. Die Gesamtkornzahl steht in engem Zusammenhang mit der Bestockung. Zwischen ihr und der Gesamtkornzahl herrscht ebenfalls enge Parallelität, dagegen nicht mit der Kornzahl des längsten Halmes. Schwache Gegensinnigkeit besteht zur Ährchenzahl, sie wird aber durch die verschiedene Taubheitsanlage überdeckt. Das Tausendkorngewicht wird durch die Gesamtkornzahl in seiner Ausbildung beeinflusst.

Beim Gesamtkorngewicht finden sich zwar mittelhohe Unterschiede zwischen den beiden Extremen, jedoch können infolge des sehr hohen m (M) gesicherte Sortendifferenzen bei dieser Eigenschaft am wenigsten erfaßt werden. Das Gesamtkorngewicht setzt sich zusammen aus Gesamtkornzahl und Tausendkorngewicht, die beide wech-

selnde Einwirkung ausüben: Zwischen Gesamtkornzahl und Halmertrag besteht kein konstantes Verhältnis, jedoch hebt der Halmertrag zeitweise die Höhe des Gesamtkorngewichts. Zum Gewicht der ganzen Pflanze herrscht gute Parallelität, zum Kornprozent ein wechselndes Verhältnis.

Beim Tausendkorngewicht sind die Schwankungen zwischen „hoch“ und „niedrig“ nur mittelgroß, Sortenunterschiede finden aber noch eine genügende Sicherung. Das Tausendkorngewicht ist abhängig von der Ährchendichte und der Anzahl der Halme. Es ist mitbestimmend bei der Höhe des Halmertrages und des Gesamtkorngewichts, hier schwach gegensinnig unter dem stärkeren Einfluß der Bestockung, dort in leidlicher Gleichsinnigkeit. Am Tausendkorngewicht macht sich die verschiedene Trockenheitsresistenz der Sorten in der Nachblütezeit deutlich geltend.

Das Kornprozent zeigt nur geringe Schwankungen zwischen den extremen Sortenmitteln, die Differenzen zwischen den einzelnen Sorten sind daher trotz des kleinen m (M) nur in geringer Zahl gesichert. Zwischen dem Kornprozent und dem Gewicht der ganzen Pflanze besteht Gegensinnigkeit der Beziehungen, ebenso in schwachem Umfange auch zum Halmertrag und zum Gesamtkorngewicht. Das Kornprozent entstammt mehr einer Wechselwirkung zwischen Pflanzengewicht und Pflanzenertrag als dem direkten Einfluß eines beider Faktoren. Zur Halmlänge und Halmzahl verhält sich das Kornprozent schwach gegensinnig.

Die untersuchten Variabilitätsverhältnisse erlauben folgende Schlußfolgerungen: Es heben sich drei Gruppen scharf heraus:

I. Eigenschaften mit geringer Variabilität, V bis zu 10:

Halmlänge,
Ährchendichte D . des längsten Halmes,
Spindellänge des längsten Halmes,
Ährchenzahl des längsten Halmes,
Tausendkorngewicht,
Kornprozent.

Diese Eigenschaften erlauben mit ihrer geringen Variabilität klarer den erblichen Wert zu erfassen, Aufspaltungen werden sie eher als die Merkmale der Gruppen II und III zeigen, zudem gehören sie zu den für die Bewertung der Züchtung wichtigsten Maßstäben. Die Eigenschaften dieser Gruppe kommen daher für die Auslese in erster Linie in Frage.

II. Eigenschaften mit einem V von 11—20:

Kornzahl des längsten Halmes,
Korngewicht des längsten Halmes.

Diese Merkmale unterliegen in stärkerem Maße als die der Gruppe I der Variabilität. Aus diesem Grunde und in Anbetracht des geringen Wertes, den sie für die Bewertung der Gesamtpflanze haben, wird ihre Anwendung als Auslesemoment nur in beschränktem Maße erfolgen können.

III. Eigenschaften mit hoher Variabilität, V 21 und darüber:

Halmzahl,
Gewicht der ganzen Pflanze,
Gesamtkornzahl,
Gesamtkorngewicht.

Diese Eigenschaften sind den Einwirkungen ihrer Lebensbedingungen stark ausgesetzt und verbinden teilweise sehr hohe Variabilität mit nur ganz geringen Unterschieden der Mittelwerte. Die Merkmale dieser Gruppe kommen daher als Auslesemomente nicht in Frage. In der Rangordnung zeigen alle vier Eigenschaften weitgehende Übereinstimmung.

Bei dem Vergleich der Mittelwerte und ihrer Variabilitätsmaße ergaben sich folgende Wahrnehmungen:

1. Eine konstante Abhängigkeit mehrerer Eigenschaften von einander, die auf eine erbliche Korrelation schließen ließe, besteht nicht, wohl besteht aber bei allen Eigenschaften ein gegenseitiges Bedingungsverhältnis mehrerer Merkmale, das

seinen Ausdruck in Gleichsinnigkeit oder Gegensinnigkeit der Beziehungen findet.

2. Eine konstante Beziehung zwischen Mittelwert und Standardabweichung und Mittelwert und Variationskoeffizient findet sich bei keiner Eigenschaft. Ausnahmefälle in dieser Hinsicht haben den Wert des Zufalls.

3. Das Schwankungsausmaß der Variabilität in den einzelnen Eigenschaften steht in keinem Verhältnis zu der absoluten Höhe der Variabilität.

4. Eine sichere Übereinstimmung der Variabilitätsrangordnungen mehrerer Eigenschaften ergibt sich nicht, dagegen besteht sie in loser Weise zwischen den Merkmalen mit hoher Variabilität; bei anderen Eigenschaften erstreckt sich die Gleichheit der Variabilitätshöhe nur auf die Gruppenzugehörigkeit, bei mehreren fehlt jede Beziehung.

5. Hinsichtlich der Höhe der Variabilität bei den einzelnen Sorten sei auf die Tabelle auf S. 79 und die Zusammenstellung der Variationskoeffizienten verwiesen.

Anhang I.

Zu der letztstehenden Tabelle.

Vergleich der Variabilitätsintensität von
12 Eigenschaften bei Sorten von 5 Getreide-
arten.

Einführung:

1. Die Variabilitätshöhe wird vergleichbar ausgedrückt durch die Variationskoeffizienten, deren Schwankungsausmaße die Spalte 1 angibt.

2. Die Steigerung der Variationskoeffizienten innerhalb einer Eigenschaft bei der jeweilig untersuchten Anzahl von Sorten wird in Prozenten des geringsten V in Spalte 2 angegeben.

3. Spalte 3 zeigt die durchschnittlichen Variationskoeffizienten.

4. Spalte 4 ordnet diese dem Range nach.

5. Spalte 5 klassifiziert sie in die Gruppen: I. V von 0—10, II. V von 11—20, III. V 21 und höher.

Ein exakter Vergleich der 5 Getreidearten fand Schwierigkeiten in der wechselnden Zahl der vermessenen Sorten. Die verglichenen Zahlen haben also nur beschränkten Wert, sie würden bei Erhöhung der Sortenzahl noch größere Schwankungen zeigen.

Um die Schwankungen daher auszuschalten, wurde als besserer, aber auch mit einer Fehlermöglichkeit versehener Vergleichswert der durchschnittliche Variationskoeffizient eingeführt und innerhalb der Getreideart mit einer Rangordnung versehen.

Ergebnisse:

Die Halm länge weist allgemein die niedrigste Variabilität auf. In der Rangordnung belegt sie bei Wintergerste und Hafer den ersten Platz und sinkt höchstens bis an dritte Stelle. Die Steigerungen der Variabilität sind zumeist hoch, um 100%, nur Sommerweizen zeigt mittlere Zunahme.

Die Ährchendichte gehört ebenfalls zu den Eigenschaften mit ausgesprochen niedriger Variabilität, sie steht an 2. oder 3. Stelle, bei Sommergerste sogar an erster. Die prozentische Zunahme der Variabilität ist mittelhoch, nur 55%; demgegenüber fällt die starke Steigerung bei Wintergerste mit 153% auf.

Das Kornprozent unterliegt in der Höhe seiner Variabilität schon höheren Schwankungen, bei Hafer fällt es bereits in die Klasse II mit mittlerem V; die Zunahme der Variabilität beträgt bei ihm 205%, groß ist die Steigerung auch bei Wintergerste mit 113%.

Die Spindellänge zeigt auch noch die niedrige Variabilität der Klasse I, auch Winterweizen überschreitet diese nur um ein geringes. Die prozentische Zunahme der Variationskoeffizienten ist mittelhoch.

Die Ährchenzahl fällt bei Hafer schon unter die Klasse II mit mittlerer Variabilität. Auffallend niedrig sind die Variationskoeffizienten bei Sommerweizen, sie erweisen sich aber als sehr schwankend (354%).

Auch das Tausendkorngewicht kann bei allen Getreidearten noch als wenig variabel bezeichnet werden.

Kornzahl und Korngewicht des längsten Halmes sind in der Höhe ihrer Variabilität innerhalb jeder Getreideart annähernd gleich. Während die Variationskoeffizienten bei Sommergerste noch niedrig liegen, finden wir sie bei Wintergerste, Winterweizen und Sommerweizen schon in der mittleren V-Gruppe; Hafer gehört in dieser Eigenschaft schon zu den hochvariablen, bei ihm ist die prozentuale Steigerung von V auch fast doppelt so hoch wie bei den anderen Getreidearten.

Einen zweiten Eigenschaftskomplex bilden die Anzahl der Halme, das Pflanzengewicht, die Gesamtkornzahl und das Gesamtkorngewicht. Sie zeigen bei allen Getreidearten eine Variabilität von über 20 V, die die Eigenschaften als Auslesemomente nicht mehr in Frage kommen läßt. Hiervon weicht nur das geringe Ausmaß der Variabilität der Halmzahl bei Sommerweizen ab, die noch zur Gruppe I gehört. Die Zunahme der Variationskoeffizienten in den vier Eigenschaften erfolgt in demselben prozentualen Verhältnis innerhalb derselben Getreideart; etwas höher ist sie bei Wintergerste, auffallend niedrig dagegen bei Winterweizen.

Die Tabelle erlaubt folgende **Schl u ß f o l g e r u n g e n** :

1. Bis auf einige Ausnahmen findet sich zwischen den 5 Getreidearten eine auffallend gute Übereinstimmung in der durchschnittlichen Höhe der Variabilität innerhalb der einzelnen Eigenschaften.

2. Zwischen dem Schwankungsausmaß der Variabilität, das sich in der prozentualen Zunahme der Variationskoeffizienten ausdrückt, und der absoluten Höhe der Variabilität läßt sich bei keiner Getreideart ein festes Verhältnis finden.

3. Ein direktes Abhängigkeitsverhältnis mehrerer Eigenschaften in Bezug auf die Höhe ihrer Variabilität und deren Schwankungsausmaß besteht bei keiner Getreideart; dagegen findet sich innerhalb jeder Getreideart eine Zusammengehörigkeit von 2 Eigenschaftskomplexen sowohl in der absoluten Höhe der Variabilität wie in dem Grade ihrer Schwankungen.

Mit dieser Übereinstimmung der Ergebnisreihen zeigt die Variationsstatistische Methode deutlich, inwieweit sie es ermöglicht, unter unseren Kulturpflanzen brauchbare Vergleichswerte zu schaffen. In ihr findet der Züchter ein wertvolles Hilfsmittel, seine Zuchtbestände in ihren Eigenschaften zu analysieren und ihre Variabilität kennen zu lernen, und er bekommt damit die Möglichkeit, diese Eigenschaften je nach ihrem Erblichkeitswerte als Beurteilungsmomente und Maßstäbe für die Anordnung der Züchtungen im System in Anwendung zu bringen.

Literaturangabe.

1. Baumann, E.: Die besten Sorten von Getreide, Hackfrüchten, Hülsenfrüchten und Ölfrüchten. Leipzig 1922.
2. Czuber, E.: Die statistischen Forschungsmethoden. Wien 1922.
3. Deutsche Hochzuchten. Herausgegeben v. Ramm, Bd. V, Berlin 1924.
4. Dierkes, F.: Variationsstatistische Untersuchungen an Winter- und Sommerweizensorten. Diss. Halle 1924.
5. Duncker, G.: Die Methode der Variationsstatistik. Arch. f. Entw. Mech. Bd. VIII, 1900.
6. Fruwirth, C.: Handbuch der Landw. Pflanzenzüchtung. Bd. IV. Berlin 1923.
7. Holdefleiß, P.: Landw. Pflanzenzüchtung. Handb. f. d. ges. Landw. von Steinbrück. Bd. II. Leipzig 1921.
8. Holdefleiß, P.: Über den Einfluß der Witterungsfaktoren auf die Ernteerträge. Kühn-Arch. Bd. IX. Berlin 1925.
9. Johannsen, W.: Elemente der exakten Erblchkeitslehre. 3. Aufl. Jena 1926.
10. Lipmann, O.: Welche Mindestzahl von Versuchen ist zur Sicherung eines zahlenmäßigen Resultats erforderlich? Zeitschr. f. angew. Psychologie. Bd. XIV. 1919.
11. Moldenhauer, M.: Die Praxis der Ausgleichsrechnung, soweit sie für die Landwirtschaft in Frage kommt. Pflanzenbau, Bd. 1, 1924.
12. Quante, H.: Die Grundlagen der Variationsstatistik und ihre praktische Anwendung. Fühlings landwirtsch. Zeitschrift, Bd. 61, 1912.

13. Ranke, K. E. und Greiner: Das Fehlergesetz und seine Verallgemeinerung durch Fechner und Pearson. Arch. f. Anthropologie. N. F., Bd. II, 1904.
14. Reinhardt, F.: Variationsstatistische Untersuchungen an Sommergerstensorten. Diss. Halle 1925.
15. Roemer, Th.: Variabilitätsstudien. Arch. für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. 1910.
16. Roemer, Th.: Der Feldversuch. Berlin 1923.
17. Roemer, Th.: Einführung in die landwirtschaftliche Pflanzenzüchtung. Berlin 1923.
18. v. Rümker, K.: Tagesfragen aus dem modernen Ackerbau (Sortenwahl). Berlin 1923.
19. Rudolf, W.: Variationsstatistische Untersuchungen an Sorten und Linien von Hafer. Diss. Halle 1926.
20. Schindler, F.: Handbuch des Getreidebaus. Berlin 1923.
21. Schneider, E.: Der Entwicklungsrhythmus der Fruchtstände bei Getreide. Beiträge zur Pflanzenzucht. 1912.
22. Wintergersten-Sondernummer. Illustr. Landw. Zeitung. Bd. 39. 1919

Am Schlusse dieser Arbeit ist es mir eine Ehre und Pflicht, Herrn Prof. Dr. Roemer meinen ergebensten Dank zu sagen für die Aufgabe, welche er mir stellte, und für die mancherlei Hilfen und Winke, die mir bei ihrer Durchführung von seiner Seite zuteil wurden.

Hohen Dank bin ich auch Herrn Assistent Vettel schuldig.



Lebenslauf.

Als Sohn des Pfarrers Otto Büchner wurde ich Friedrich Karl Gustav Büchner am 23. April 1900 in Posen geboren. Nach dreijähriger Vorschule und neunjährigem Besuch des Kgl. Auguste Viktoria-Gymnasiums meiner Vaterstadt legte ich im März 1918 die Reifeprüfung ab. Ich trat ins Heer ein und stand die letzten Monate des Krieges im Westen im Felde. Nach Kriegsschluß ging ich, um mir die für mein landwirtschaftliches Studium nötigen praktischen Kenntnisse anzueignen, nach Rittergut Schloß Vockstedt (Kreis Sangerhausen), Domäne Gatterstädt (Kreis Querfurt) und Schloßdomäne Ballenstedt am Harz. Im Herbst 1922 begann ich in Halle mein Studium und beschloß es im Winter 1925 mit dem Landw. Dipl.-Examen und der Saatzuchtinspektorenprüfung.

Die Variabilitätsintens

	Winter-Gerste (19 Sorten)					Winter-Weizen (12 Sorten)				
	V = Schwan- kung 1.	V = Steige- rung in ‰ 2.	V = Durch- schn. 3.	Rangordng. 4.	Klasse 5.	V = Schwan- kung 1. *)	V = Steige- rung in ‰ 2.	V = Durch- schn. 3.	Rangordng. 4.	
Halmlänge	1,8— 3,8	115	2,8	1	I	4,1— 7,9	93	6,0	2	
Aehrendichte	2,5— 6,4	153	4,5	2	I	5,3— 8,6	62	6,9	3	
Kornprozent	5,8—12,3	113	9,1	3	I	6,2— 9,6	55	7,9	4	
Spindellänge	7,1—11,7	65	9,4	4	I	7,9—14,9	89	11,4	6	
Aehrchenzahl	7,7—11,2	45	9,5	5	I	7,7—12,8	66	10,2	5	
Tausendkorngewicht	7,0—14,4	104	10,7	6	I	3,7— 6,5	76	5 1	1	
Kornzahl des längsten Halmes	11,3—16,1	43	13,7	7	II	13,9—20,1	55	16,0	7	
Korngewicht des längsten Halmes	13,0—20,8	60	16,9	8	II	13,2—19,0	44	16,2	8	
Anzahl der Halme	18,3—36,9	102	27,6	9	III	36,7—43,4	18	40,0	9	
Gewicht der ganzen Pflanze .	23,3 41,9	80	32,6	10	III	38,3—48,1	26	43,1	11	
Gesamt-Kornzahl	24,9—42,4	70	33,6	11	III	38,3—48,9	28	43,6	12	
Gesamt-Korngewicht	24,3—43,1	78	33,7	12	III	32,3—49,7	54	41,0	10	

*) Variationsstatistische Zahlen von Fr. Dierkes (4)

**) " " " Fr. Reinhardt (14)

***) " " " W. Rudolf (19)

tät bei 12 Eigenschaften.

Klasse	Sommer-Weizen (13 Sort.)					Sommer-Gerste (20 Sort.)					Hafer (29 Sorten)				
	V = Schwan- kung 1.*)	V = Steige- rung in ‰ 2.	V = Durch- schn. 3.	Rangordng. 4.	Klasse 5.	V = Schwan- kung 1.**)	V = Steige- rung in ‰ 2.	V = Durch- schn. 3.	Rangordng. 4.	Klasse 5.	V = Schwan- kung 1.***)	V = Steige- rung in ‰ 2.	V = Durch- schn. 3.	Rangordng. 4.	Klasse 5.
I	4,2— 7,1	69	5,6	2	I	3,2— 6,5	103	4,8	3	I	3,8— 7,6	100	5,7	1	I
I	4,7— 6,9	47	5,8	3	I	2,5— 4,0	60	3,2	1	I	—	—	—	—	—
I	6,3—11,1	76	8,7	7	I	3,5— 5,8	66	4,6	2	I	6,3—19,2	205	12,7	4	II
II	6,2— 9,6	55	7,9	5	I	5,4— 8,9	65	7,1	6	I	6,4—10,5	64	8,4	3	I
I	1,3— 5,9	354	3,6	1	I	4,6— 8,0	74	6,3	5	I	13,1—23,3	78	18,2	5	II
I	6,2—10,4	68	8,3	6	I	4,3— 7,8	82	6,0	4	I	4,0—10,1	152	7,0	2	I
II	11,5— 17,1	49	14,3	8	II	5,6— 8,9	59	7,2	7	I	15,7—31,1	98	23,4	6	III
II	11,6—17,7	53	14,6	9	II	7,9—12,0	52	9,9	8	I	17,1—32,3	89	24,7	8	III
II	6,7— 8,6	28	7,6	4	I	19,1—27,5	44	23,3	9	III	20,6—34,6	68	27,6	11	III
II	24,3—32,9	35	28,6	12	III	19,9—28,4	43	24,1	10	III	19,2—28,9	51	24,0	7	III
I	21,7—28,7	32	25,2	10	III	19,9—28,5	43	24,2	11	III	20,1—31,8	58	25,9	9	III
I	24,1—33,0	37	28,5	11	III	20,0—28,9	45	24,4	12	III	20,9—32,3	55	26,6	10	III